

# ارزیابی روش پاکتی تعدیل یافته جهت سنجش میزان حساسیت کنه *Boophilus annulatus* در مقابل ترکیبات ضدکنه

- مهدی خلچ، عضو هیأت علمی سازمان دامپزشکی کشور
- صدیقه نبیان، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
- صادق رهبری، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
- حسن لدنی، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
- وحید عطارد، عضو هیأت علمی سازمان دامپزشکی کشور

تاریخ دریافت: خردادماه ۱۳۸۴ تاریخ پذیرش: اسفندماه ۱۳۸۴

Email: khalaj.mehdi@gmail.com

## چکیده

معروفی روش استاندارد تشخیص مقاومت در برابر سموم یکی از نیازهای عمدۀ نظارت و مراقبت مقاومت کنه‌ها در سطح مزرعه می‌باشد. انتخاب روش آزمایشگاهی مناسب، حساسیت روش به منظور شناسایی مقاومت، قابلیت انجام آزمایش برای کلیه گروه‌های شیمیائی مورد استفاده و ارزان بودن روش، مورد توجه کلیه مراکز تحقیقاتی می‌باشد. در این مطالعه به منظور رفع تنگنای دسترسی به پاکت‌های آغشته به سموم کیت فائق، تلفیقی از روش ساندویچ شاو و تست پاکتی فائق به عمل آمده است. این روش قابلیت انجام ازمایش با هر سه تجارتی مورد نظر را به عنوان مأخذ دارد تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده بر اساس آزمون پروریت نشان داد که کمترین میزان سم که ۵٪ لاروها را تلف نماید می‌تواند بعنوان اطلاعات پایه قلمداد گردد و این معیار در مقایسه با مقادیر بیشتر هر سه در مورد گونه‌های مشابه کنه می‌تواند تعیین‌کننده عامل مقاومت در هر منطقه باشد. در این مطالعه کمترین میزان غلظتی از سه دیازینون که ۵٪ نوزادان کنه *B. annulatus* را تلف نماید برابر  $0.003 \text{ میلی گرم}$  می‌باشد و غلظتی از سم که ۹۹٪ لاروها را تلف می‌نماید برابر  $0.10 \text{ میلی گرم}$  بوده و این غلظت معادل  $1:20$  غلظت توصیه شده سه دیازینون می‌باشد. با توجه به مطالب فوق و نیز شبی خط رگرسیون این موضوع در ذهن تداعی می‌شود که جمعیت کنه مورد مطالعه در این تحقیق، گرایش به مقاومت را از خود نشان نمی‌دهد.

کلمات کلیدی: بوفیلوس، کنه‌کش، مقاومت، آزمایش پاکتی نوزادان کنه، ایران

Pajouhesh &amp; Sazandegi: No 75 pp: 39-45

**Evaluation of modified larval pocket test for determining the Sensitivity of *Boophilus annulatus* against acaricides**

By: M. Khalaj, Academic Staff of Veterinary Organization of Iran

Nabian, S. Assistant Professor of Parasitology Department of Veterinary faculty Tehran University

Rabfari, S. Professor of Parasitology Department of Veterinary Faculty Tehran University

Ladoni, H. Professor of Health School of Tehran Medical Science University

Atarod, V. Academic Staff of Veterinary Organization of Iran

In order to assess of tick resistance against domestic commercial acaricidal compounds ,a standard technique is the main requirement of a resistance test.It should be capable for application to any commercial formulated pesticide , the next requirement is simpilicity and high susceptibility of test and also the low cost of the test has been interested. In this study , the lack of FAO's impregnated filter paper pocket has been dissolved , whereby, the filter paper can be easily impregnated with each concentration of commercial acaricides then instesd of having sandwich paper, it was modified in pocket shape.our modification might have some advantages in having the same suitability of resistance screening of each insecticide as reference material. Probit analysis of these results indicated that minimum lethal concentration to kill 50 % of tick larvae of *Boophilus annulatus* was 0.003 and expected concentration to give 99% mortality of the tick larvae was 0.01 which equal to 1:20 of the recommended dose of diazinon. It can be concluded that obtained base line data and reggration line are drawn to fit this point that it revealed , the tick populations did not show any resistance status in this monitoring test.

**Kewords:** *Boophilus annulatus*, Acaricide, Resistance Larval Packet test, Iran

**مقدمه**

اولین گزارش کنه از ایران توسط والدهایم (۱۸۲۴) در مورد *Argas persicus* می‌باشد، تولوزان پژوهش ناصرالدین شاه ساس سفید مراغه را به عنوان ناقل تب راجعه معرفی نمود و *Ornithodoros tholozani* آنرا ۱۸۷۶ Laboulbene در طول سال‌های ۱۹۳۶-۱۹۴۶ مطالعه وسیعی بر روی ناقلين تب راجعه توسط Baltazard و Delpi و Raryi به منظور شناسایی کنه های ناقل تیلریا اولین گزارش کنه های سخت را منتشر نمودند(۴). عباسیان پراکنش کنه های سخت را در جنوب کشور گزارش نمود(۱). مظلوم انتشار جغرافیایی کنه های سخت را در کشور مورد توجه قرار داد (۱۴). در سال ۱۹۷۶ گزارش جامعی از نوزاد و نوچه کنه های سخت جوندگان ایران ارائه نمود(۹). Hoogstraal و همکاران در سال ۱۹۸۰ اکنه های سخت پستانداران وحشی و اهمیت بهداشتی آنها را مورد مذاقه قرار دارند(۱۰). رهبری طی مطالعه‌ای دیدگاه‌های اکولوژی کنه های دامی ایران را بررسی نمود(۱۸).

در بسیاری از مناطق جهان، کنه ها تهدیدی جدی برای سلامت دامها و بهداشت عمومی محسوب می‌شوند. زیرا که آنها قادر به ایجاد خدمات مستقیم و همچنین انتقال بیماری های انگلی جدی مانند بازیا، آناپلاسمای و تیلریا می‌باشند. کنترل کنه ها و بیماری های منتقله از آنها مهمترین راهکار بهداشتی دام بمنظور حفاظت چهارپایان و پیشبرد سلامت محصولات دامی می‌باشد (۶). در مطالعه‌ای که به طور مشترک توسط دفتر خواروبار کشاورزی سازمان ملل (FAO)، آزادس توسعه بین‌المللی کشور دانمارک (DANIDA) و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) طی سال‌های ۱۹۸۶-۱۹۸۷ صورت گرفت تخمین زده شده است که تقریباً ۱/۲۸٪ جمعیت ۰/۸۰ میلیارد راسی گاو موجود در جهان، در معرض خطر کنه ها و بیماری های منتقله از آن قرار دارد و اعلام گردیده که هزینه های جهانی کنترل و نیز زیان های کاهش تولیدات دامی ناشی از گزش کنه ها سالیانه ۷ میلیارد دلار و یا به عبارت دیگر ۷ دلار به ازای هر راس در سال می‌باشد(۱۵).

بنابر همین اهمیت، دامداران سعی نموده اند با استفاده از کنه کش ها در موقع بروز آلودگی به طرق مختلف با ان مبارزه نمایند. کاربرد متوالی و یا استفاده از دوز نا مناسب سموم باعث گردیده که در چند دهه اخیر گزارشات متعددی از بروز مقاومت در کنه ها نسبت به آفت کش ها کش ها انتشار یابد.

به منظور سنجش کیفی سموم، متداول ترین روش استفاده از Bioassay می‌باشد. به عبارت دیگر در این روش از موجودات زنده برای اندازه گیری کیفی سموم استفاده می‌گردد. مشکل عمدی در راماندازی و استمرار سیستم ارزیابی مقاومت کنه ها فقدان روش های استاندارد می‌باشد که خوشبختانه به دلیل اهمیت موضوع مورد توجه مؤسسات بین‌المللی قرار گرفته است و هم اکنون آزمایشگاه مطالعه مقاومت اکارسیدها واقع در برلین از طریق فائق مسئولیت تهیه این روش های استاندارد را یافته است. در این مطالعه کوشش گردیده که با اعمال تغییراتی در روش پاکتی فائق، روشی ساده جهت ارزیابی کیفی سموم معرفی گردد (۸).

## مواد و روش کار

طول تا خورده و بر روی هم قرار می‌گرفت. سپس از طریق دو شیرازه ۸ سانتی متری از دو ضلع طولی مسدود می‌گردید به شکلی که بخش باز پاکت کاغذی در قسمت فوقانی قرار می‌گرفت. پاکت کاغذی بر روی پایه شیشه‌ای که واحد دو میلی لیتر از رقت سم مورد نظر می‌توانست تمام داده می‌شد (شکل ۲؛ ۰/۴ میلی لیتر از رقت سم مورد نظر می‌توانست تمام سطح پاکت را آغشته نماید. چنین پاکت هائی آمادگی دریافت نوزادهای کنه را خواهند داشت.

حدود ۱۰۰ لارو ۱۴ تا ۲۱ روزه از نتاج کنه‌های مشکوک به کاهش حساسیت نسبت به سم دیازینون به هر یک از پاکتها حاوی رقت‌های مختلف سم اضافه می‌گردید و بلافضله درب قسمت فوقانی پاکت توسط یک شیرازه دیگر مسدود می‌گشت و متعاقباً به ظروف دو جداره انتقال داده و به مدت ۲۴ ساعت تحت شرایط انکوباتور ۲۸



شکل شماره ۲ - روش تعديل یافته لارو پاکتی جهت ارزیابی سموم

درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۵ درصد نگهداری می‌گردید (۱۳) به منظور کنترل نوزاد کنه و ممانعت از فرار آنها کلیه عملیات معرفی نوزاد کنه به پاکت بر روی یک تشتک وارونه شده در درون تشتک بزرگتر حاوی ساولن انجام می‌پذیرفت. حداقل ۵ تکرار آزمایش و در هر آزمایش برای کنترل رقت‌های مختلف ۲ تکرار و جمیعاً ۱۱۰ مورد آزمایش از نتاج اولیه کنه صورت پذیرفت.

به منظور شمارش میزان مرگ و میر لاروهای پس از قرار دادن پاکت در روی پایه شیشه‌ای، با برداشتن گیره‌های پلاستیکی، کاغذ را باز کرده و با سنجاق دو طرف آن ثابت می‌شد، با کمک ذره بین تمامی لاروهای دارای حرکت به عنوان لارو زنده شمارش می‌شد و در این روند برای اطمینان از شمارش کامل لاروهای زنده، با هوای بازدم کمی آنها تحریک می‌شدند. مابقی لاروهای بدون حرکت و یا آنها که در جا ضمایم خود را نشان می‌دادند به عنوان کنه مرده محسوب می‌شدند، در موافقیکه تمامی لاروها زنده و یا مرده بودند شمارش صورت نمی‌گرفت و میزان مرگ و میر صفر و با صد درصد منظور می‌گردید، شمارش، همواره از پاکتها کنترل آغاز و با پاکتها از غلظت پایین به بالا ادامه می‌یافت تمامی نتایج در فرم‌های مخصوص درج می‌گردید.

در این تحقیق از آزمایش تغییر یافته پاکتی لاروها<sup>۱</sup> (LPT) استفاده و کنه‌های ماده *B. annulatus* بعنوان موجود زنده برای اندازه‌گیری کیفی سم به کار گرفته شد (۱۶) این کنه‌ها مستقیماً از بدن گاو در پایان خونخواری و قبل از رها کردن میزبان در استان‌های مازندران و گیلان جمع‌آوری شدند و برای جداسازی، کنه‌ها را از نزدیکی پوست بدن میزبان گرفته و با حرکتی مخالف جهت اتصال با قدری فشار از بدن میزبان جدا کرده و دقت لازم برای اجتناب از ایجاد صدمه به ضمائم دهانی به عمل آمد. کنه‌های هر راس دام، پس از جدا کردن میزبان میزبان وارد ظروف نمونه‌برداری پلاستیکی که درب آن دارای روزنه‌های ریز بود، گردیده و مشخصات موردنظر بر روی آن نوشته می‌شد. همچنین در هنگام انتقال به آزمایشگاه، ضمن تامین رطوبت، از طریق قرار دادن پنبه مرطوب در مقابل درب ظروف نمونه، آنها را در کیسه پلاستیکی قرار داده سپس به منظور حفاظت از حرارت و نور در داخل جعبه‌های مقوایی قرار می‌گرفت. در آزمایشگاه، آن دسته از کنه‌ها که دارای تحرک، رنگ طبیعی و به طور نسبتاً کامل خون خورده بودند برای انجام آزمایش انتخاب شدند. سپس در الکل ۷۰ درجه غوطه ور و شستشو شدند تا از آلودگی‌های بعدی جلوگیری شود. پس از خشک کردن کنه‌ها، آنها در لوله‌های استریل به قطر ۱۰ میلیمتر و ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر قرار می‌گرفتند که درب این لوله‌ها با پنبه‌های مصنوعی (پنبه شکسته بندی) مسدود می‌گردید. لوله‌ها را در انکوباتور تحت رطوبت ۸۰-۸۵ درصد و درجه حرارت ۲۷-۲۹ درجه سانتیگراد نگهداری و پس از مرحله تخم گذاری تخم‌ها را در لوله مجزا تقسیم (حدوداً ۱۰۰۰ تخم) و جهت تولید لارو (شکل ۱) آنها مجدداً به انکوباتور انتقال داده شدند سه دیازینون در رقت‌های مختلف: توصیه شده، ۱:۵، ۱:۱۰، ۱:۲۰، ۱:۴۰، ۱:۸۰، ۱:۱۶۰، ۱:۳۲۰ و ۱:۱۲۸۰ و ۱:۱۶۴۰ رفت توصیه شده مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از آب مقطر نیز برای گروه کنترل استفاده گردید.

به منظور تهیه پاکتها کاغذی از فیلتر کاغذی واتمن شماره ۴ به ابعاد ۱۰ در ۸ سانتیمتر استفاده گردید که این قطعه کاغذ از قسمت میانی



شکل شماره ۱ - نوزاد کنه *B. annulatus* در لوله کشت

## تصحیح نتایج

می‌توان از خط مستقیم طرف راست (c) تمیز داد. خط c در سمت راست که مشخص کننده  $LC_{50}$  بیش از حد طبیعی است، شاخص مقاومت همگون خواهد بود. حال با توجه به میزان شبیه خط می‌توان تمایل به طرف حساسیت و یا مقاومت را تعیین نمود به این معنی که افزایش شبیه که خط را به طرف راست تمایل می‌کند می‌تواند نشانگر تمایل جمعیت به سوی ناهمگونی زیاد و ایجاد مقاومت که نهایتاً جمعیت همگون مقاوم را بوجود می‌آورد، باشد (11).

## نتایج

اطلاعات برحسب تفاوت درصد تلفات لاروهای کنه در برابر رقت‌های مختلف سم دیازینون در جدول شماره ۱ درج گردید. همانطوری که در این جدول مشاهده می‌شود تارق  $LC_{50}$  غلظت توصیه شده سم دیازینون  $\approx 1/100$  لاروهای کلیه کنه‌های مورد آزمایش تلف شده‌اند و از ظاهر اینگونه می‌توان برداشت کرد که هیچ‌گونه مقاومتی در کنه‌های بووفیلوس در برابر این سم بوجود نیامده است.

## نتایج آزمون پروبیت

به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق و معرفی میزان دز و یا غلظتی از سم که بتواند ۵۰ و ۹۹ درصد لاروها را تلف نماید، از برنامه نرم افزار کامپیوتری پروبیت استفاده گردید و در این برنامه پس از ارائه داده‌های آماری آزمایشات به کامپیوتر، متغیرهای مختلف استخراج گردید و سپس بر اساس آن نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت (جدول ۲).

نتایج بدست آمده از پروبیت سم دیازینون با توجه به شبیه خط رگرسیون، اختلاف معنی دار مریع کای محاسبه شده ( $36/8$ ) و مریع کای استاندارد ( $5/07$ ) بیانگر جمعیت غیر همگن و تبعه ژنتیکی کنه‌های مورد آزمایش با سم دیازینون می‌باشد (جدول ۳) ولی از آنجاکه در نتایج حاصل از آزمون پروبیت، پس از استخراج غلظت‌های از سم که ۵۰ و ۹۹ درصد لاروها را تلف نمود، معادل تلفات در رقت‌های  $1/320$  و  $1/160$  رقت

پس از شمارش پاکت‌های کنترل در صورتیکه درصد تلفات کمتر از ۵ درصد بود، نتایج مستقیم مورد استفاده قرار می‌گرفت. اگر تلفات لاروهای کنترل بین ۵-۱۰ درصد بود، درصد تلفات در کلیه غلظت‌ها با استفاده از فرمول آبوت اصلاح می‌شد و نتایج در جدول وارد می‌گردید و چنانچه درصد تلفات کنترل بیش از ۱۰ درصد بود آزمایش مورد قبول واقع نمی‌گردید.

$$\text{درصد تلفات کنترل} - \text{درصد تلفات آزمایش} * 100$$

$$\text{فرمول آبوت} = \frac{\text{درصد تلفات کنترل} - 100}{\text{درصد تلفات}} \quad (1)$$

## محاسبه نتایج مطالعه

به منظور ارزیابی میزان حساسیت و یا وجود مقاومت احتمالی کنه‌ها در برابر سموم باید نسبت به تعیین رقته از سم که بتواند  $50$  و  $99$  درصد لاروها را تلف نماید اقدام نمود. برای این منظور ابتدا میزان ماده موثر در مقداری از محلول سم که سطح پاکت حاوی لارو را به ترکیبات ضد کنه آگشته می‌نمود محاسبه گردید ( $4/0$  میلی لیتر محلول سم در این آزمایش برای آگشته کردن سطح پاکت‌ها، که  $63$  سانتیمترمربع مساحت داشت، استفاده شد؛

## آزمون پروبیت (probit)

برای نمایش منحنی پروبیت، درصد غلظت روی محور X و مرگ و میر پروبیت (لگاریتم مقادیر مورد انتظار با  $5$  درصد احتمال خطاط و  $95$  درصد سطح اطمینان) روی محور Y قرار می‌گیرد. چنانچه جمعیت از حساسیت همگون برخوردار باشد، خط همبستگی مستقیم (a) خواهد بود (با غلظت کم) اگر نمایش خط به صورت منحنی (خط b) باشد، مشخص کننده آنست که جمعیت ناهمگون و مخلوطی از حساس و مقاوم است. قسمت افقی این خط بسته به نسبت کنه‌های مقاوم در نمونه جمعیت، متغیر است. اگر عامل مقاومت کم باشد قسمت صاف را به سختی

جدول ۱- تاثیر میزان ماده مؤثره دیازینون  $60\%$  در رقت‌های مختلف

درصد تلفات اصلاح شده	درصد میلیگرم ماده مؤثر در یک سانتیمتر مربع	
۴/۵	آب مقطر	کنترل
۱۰۰	۱/۶	توصیه شده
۱۰۰	۰/۳۲	۵:۱
۱۰۰	۰/۱۶	۱۰:۱
۱۰۰	۰/۰۸	۲۰:۱
۱۰۰	۰/۰۴	۴۰:۱
۱۰۰	۰/۰۲	۸۰:۱
۱۰۰	۰/۰۱	۱:۱۶۰
۸۴	۰/۰۰۵	۱:۳۲۰
۴۷	۰/۰۰۲۵	۱:۶۴۰
۵/۵	۰/۰۰۱۲۵	۱:۱۲۸۰

جدول ۲- پروبیت سم دیازینون بر حسب تلفات اصلاح شده و نسبت تلفات پیش بینی شده

غلظت (درصد میلی گرم در ۱ سانسیتمتر مریع)	تعداد کنه های مرده و زنده	تعداد کنه های مرده	درصد تلفات	تلفات اصلاح شده نسبت به کنترل	نسبت تلفات پیش بینی شده
کنترل	۱۳۹۲	۶۱	۰/۰۴۳۸	۰/۰۰۰۰	۰/۰۳۹۷
۰/۰۰۱۲	۵۳۲	۲۹	۰/۰۵۴۵	۰/۰۱۵۴	۰/۰۵۸۳
۰/۰۰۲۵	۷۵۸	۳۵۷	۰/۴۷۱۰	۰/۴۴۹۱	۰/۳۸۲۳
۰/۰۰۵۰	۹۸۲	۷۹۳	۰/۸۰۷۵	۰/۷۹۹۶	۰/۸۳۵۳
۰/۰۱۰۰	۵۷۹	۵۷۸	۰/۹۹۸۳	۰/۹۹۸۲	۰/۹۸۷۷
۰/۰۲۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰	۰/۹۹۸۸
۰/۰۴۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰
۰/۰۸۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰
۰/۱۶۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰
۱/۶۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰

جدول ۳- تعیین پارامترهای مورد محاسبه از جدول پروبیت برای کنه *B. annulatus*

مریع کای محاسبه شده	مریع کای استاندارد	میانگین	انحراف	شیب خط رگرسیون ± خطای استاندارد
۳۶/۸۰۰	۱۵/۵۰۷	۳/۵۳۱۸۰۱	۰/۲۲۶۳۹	۴/۲۲۵۸۵۳ ± ۰/۳۲۹۸-۸

توصیه شده می باشد تا مادامیکه آزمون مجددی صورت نگیرد ونتایج آن مقایسه نشود نمی توان در خصوص میزان حساسیت و یا مقاومت احتمالی کنه مورد مطالعه اظهار نظری نمود(جداوی ۴ و ۵).

**مشکل**

مشکل عمده راه اندازی و استمرار سیستم مراقبت مقاومت کنه ها، فقدان روش های استاندارد تشخیص کننده های رشد آکارین ها مانند فلوآزورون بکار رود (۷) آزمایش غوطه وری بالغین (Adult Immersion Test) توسط Rummond و همکارانش در سال ۱۹۷۳ ابداع گردید. در این روش از کنه های ماده خونخواره به منظور تعیین تاثیر نسی آکارسیدهای جدید بر علیه تعدادی از گونه های کنه استفاده می شود. این آزمایش حتی قبل از آن که استاندارد شود در آزمایشگاه های متعددی مورد استفاده قرار گرفت، این روش در مورد لاكتون های ماکروسیکلیک و فلوآزورون هم کاربرد دارد(۱۹).

در این مطالعه به منظور رفع تنگی دسترسی به پاکت های آغشته به سموم کیت فائو، ادغامی از روش ساندویچ شاو و تست پاکتی فائو به عمل آمد تا بدین طریق این قابلیت برای انجام ازمایش وجود داشته باشد که هر سم مورد نظر را بتوان به عنوان مأخذ استفاده نمود. پس از تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آزمون پروبیت، کمترین میزان غلظتی از سم که ۵۰٪ لاروها را تلف نمود به عنوان اطلاعات پایه قلمداد گردید و از آنچاکه متداول ترین

توصیه شده می باشد تا مادامیکه آزمون مجددی صورت نگیرد ونتایج آن مقایسه نشود نمی توان در خصوص میزان حساسیت و یا مقاومت احتمالی کنه مورد مطالعه اظهار نظری نمود(جداوی ۴ و ۵).

### بحث

مشکل عمده راه اندازی و استمرار سیستم مراقبت مقاومت کنه ها، فقدان روش های استاندارد تشخیص کننده های رشد آکارین ها مانند فلوآزورون بکار رود اهمیتش توجه دولتها، موسسات بین المللی و مراکز علمی را بخود معطوف کرده است، و یکی از موضوعات اساسی مورد پیگیری مرکز مطالعات مقاومت آکارسیدی وابسته به فائو می باشد(۸) به منظور انتخاب روش آزمایشگاهی مناسب، حساسیت روش جهت شناسایی مقاومت، قابلیت انجام آزمایش برای کلیه گروه های شیمیائی مورد استفاده و ارزان بودن روش، مورد توجه می باشد.

آزمایش غوطه وری لارو (Shaw Larval Immersion Test) یک روش سنجش زیستی لارو می باشد که توسط Shaw به شکل وسیع در تحقیقات ارزیابی مقاومت استفاده گردیده است.اما اکنون ثابت گردیده است که این روش نمی تواند در بررسی مقاومت بر علیه فلوآزورون قابل استفاده باشد(۲۰) سازمان خواروبار جهانی از سال ۱۹۷۵ آزمایش پاکتی لاروها (Larval Packet Test) را به منظور مطالعات صحراei تعیین مقاومت کنه ها در برابر سموم خصوصاً سموم ارگانوفسفره و پایرو

جدول ۴- محاسبه LC<sub>99</sub> و LC<sub>50</sub> بر حسب غلظت سم دیازینون بر علیه کنه بوفیلوس در جدول پروفیت

سطح اطمینان ۹۵٪		غلظت آزمایش	درصد تلفات
حداکثر	حداقل		
۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۱
۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۵
۰/۰۰۲	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۱۰
۰/۰۰۲	۰/۰۰۱	۰/۰۰۲	۱۵
۰/۰۰۳	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳	۵۰
۰/۰۰۶	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	۸۵
۰/۰۰۷	۰/۰۰۵	۰/۰۰۶	۹۰
۰/۰۰۹	۰/۰۰۶	۰/۰۰۷	۹۵
۰/۰۱۴	۰/۰۰۹	۰/۰۱۰	۹۹


جدول ۵- تطبیق غلظت آزمایشات با نتایج پروفیت در مورد سم دیازینون

معادل در آزمایش	LC <sub>99</sub> (پروفیت)	معادل در آزمایش	LC <sub>50</sub> (پروفیت)	منطقه / غلظت
(۰/۰۱):۱۶۰	۰/۰۱۰	(۰/۰۰۵):۱۳۲۰	۰/۰۰۳	گیلان و مازندران

روالی نیز در مطالعه Luguru و همکاران در سال ۱۹۸۴ در آزمایش پاکتی لاروها و همچنین مطالعه Baker و Mathewson در سال ۱۹۷۵ با استفاده از آزمایش غوطه‌وری لاروها (روش شاو) صورت پذیرفته است (۱۲، ۱۱) بر این اساس می‌توان بیان نمود که در این مطالعه کمترین میزان غلظتی از سم دیازینون که بتواند ۵۰٪ نوزادان کنه *B. annulatus* را تلف نماید برابر ۰/۰۰۳ و غلظتی از سم که بتواند ۹۹٪ لاروها را تلف می‌نماید برابر با ۰/۰۱۰ بوده و این غلظتها معادل ۱:۳۲۰ و ۱:۱۶۰ هستند. غلظت توصیه شده سم دیازینون می‌باشد. ولی با توجه به شبیه خط رگرسیون و اختلاف معنی‌دار مریع کای محاسبه شده و استاندارد که مبین تنوع ژنتیکی در جمیعت کنه‌های تحت مطالعه می‌باشد. به علت عدم امکان دسترسی به گونه حساس و استاندارد، تفسیر ارائه شده حاصل از این تحقیق را می‌توان به عنوان اطلاعات پایه برای انجام آزمایشات و مطالعات بعدی منظور نمود.

نمودار شماره ۱: چگونگی خط رگرسیون در ارتباط با مقاومت

روش بررسی مقاومت، مقایسه میزان مرگ و میر دو گونه حساس آزمایشگاهی و گونه وحشی تهیه شده از مزرعه در برابر غلظت‌های مختلف سوموم و یا مقایسه غلظتی از سم که ۵۰٪ لاروها را در این دو گونه تلف نماید می‌باشد و در کشور ما که گونه حساس و استاندارد وجود نداشت لاجرم نمی‌توان میزان حساسیت و یا عامل مقاومت را در این مطالعه محاسبه نمود لیکن با راماندازی این روش راه برای انجام آزمایشات ارزیابی مقاومت گونه‌های کنه در برابر سوموم در مناطق مختلف هموار گردیده است. چنین



## سپاسگزاری

از اداره کل دارو و مواد بیولوژیک سازمان دامپزشکی کشور و همچنین معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به دلیل همکاری در انجام این تحقیق، تشکر می‌شود.

## پاورقی

1- LPT: Larval Packet Test

## منابع مورد استفاده

- Ent. Obozr., 55(2; 467-479.
- 10- Hoogstraal, H .1980; (Ixodidea) from wild sheep and goats in Iran and medical and veterinary implications. Fieiana Zoology,12: 1-16
- 11- Luguru,S.M, Banda,D.S., and Pogram,R.G.1984; Susceptibility of tick to acaracide in Zambia. Animal Hith.Prod.16,21-26.
- 12- Mathewson, Mdand Baker, J.A.F.1975; Arsenic resistance in species of multi – host ticks in the Republick of South Africa and swasiland, Afr.Vet. Ass.46(4) 341-344.
- 13- Mathewson, MD, Blackman,G.G and Hirst ,R.G.1980; Tick rearing in rabbit, Veterinary record 107, 491.
- 14- Mazloom, Z. .1971; Ticks of domestic animalsin Iran: Geographic distribution,host relation and seasonal activity.J.Vet Fac., Univ.Tehran,Iran,27:1-31.
- 15- Nari, A. and Hansen, J.w. .1999a; Animal production and Health Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Vialle delle di Caracalla-00100 Rome, Italia.
- 16- Nari, A.,and Hansen, J.w. .1999b; Resistance of ecto- and endo-parasites: Current and future solutions, 67th General Session. International Committee. OIE. Paris. 17-21May.
- 17- Rafyi, A., Maghami, G. .1965; Etat actuel de nos connaissances sur les Argasidae de L, Iran. Arch.Inst.Razi, 17:1-16
- 18- Rahbari,S.1995; Studies on some ecological aspects of tick fauna of West Azarbeyejan,Iran. J.Appl.Anim.Res.7: 189-194.
- 19- Rummond,R.O.,Ernst, S.E., Trevino,J.L, Gladny, W.J., Graham,O.H. .1973; *Boophilus annulatus* and *Boophilus micropolis*: Laboratory test insecticide. J.Econ. Entomol.66: 130-133.
- 20- Show, R.D.1996; Culture of an organophorous resistant strain of *Boophilus micropolis*. Bull.Ent. Res,56:907-914.

