



شماره ۷۰، بهار ۱۳۸۵

در امور دام و آبزیان

زیست‌شناسی تولید مثل ساردین سند (*Sardinella sindensis*) در آبهای ساحلی منطقه جاسک

• علی سالارپور و • محمد درویشی، کارشناسان بخش مدیریت ذخایر پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

تاریخ دریافت: شهریور ماه ۱۳۸۳ تاریخ پذیرش: اسفند ماه ۱۳۸۳

Email: a_salarpour@yahoo.com

چکیده

نتایج حاصل از بررسی زیستی ساردین سند (*Sardinella sindensis*) صید شده توسط شناورهای مجهز به تورپرساین از آبان ماه ۸۰ تا آبان ۸۱ در آبهای ساحلی منطقه جاسک نشان داد که اوچ اصلی تخم ریزی مشاهده شده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ بود، و دو اوچ دیگر نیز در تیرماه و مهرماه همان سال مشاهده شد. میانگین و انحراف معیار هم‌آوری مطلق به دست آمده برابر با 18366 ± 9607 عدد تخم بود. مقدار LM₅₀ برای ساردین سند ۱۵۵ میلی متر محاسبه شد. نسبت جنسی ماده به نر طی دوره بررسی اختلاف معنی دار را در سطح قابل انتظار (۱:۱) نشان نداد ($p > 0.05$). رابطه بین طول کل و هم‌آوری مطلق برای این گونه $y = 3E-0/9x^{5/8048}$ بدست آمد.

کلمات کلیدی: دریای عمان، منطقه جاسک، *Sardinella sindensis*، تور پرساین، هم‌آوری، LM₅₀، نسبت جنسی



Pajouhesh & Sazandegi No 70 pp: 59-64

Reproduction characteristics of sind sardine (*Sardinella sindensis*) in Jask coastal waters

By: A. Salarpour, and M. Darvishi, Experts in Stock assessment dept. Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute. Bandar Abbas, Iran

Reproduction biology of sind sardine (*Sardinella sindensis*) caught by purse seiner boats along coastal waters of Jask area investigated from November 2000 to November 2001. The results indicated that major breeding peak occurs in May with two others in July and October. Mean and Sd of absolute fecundity was estimated at 18366 ± 9607 . LM₅₀ estimated 155 mm in total length for females. The research showed that sex ratio of this species was not significantly different from (1:1) ratio ($p > 0.05$). Length - absolute fecundity relationship was calculated as: $y = 3E-0/9x^{5/8048}$.

Key words: Oman Sea, Jask, Sind sardine (*Sardinella sindensis*), Purse seine, Fecundity, Lm₅₀, sex ratio.

مقدمه

دریای اعمان از لحاظ وجود ذخایر ارزشمند آبزیان یکی از نعمت‌های مهم طبیعی برای کشور ایران محسوب می‌شود. از میان ذخایر متنوع آبزیان این دریا، خانواده شگ ماهیان^۱ به ویژه ساردنین ماهیان از اهمیت خاصی برخوردار هستند. افزایش برداشت از این ذخایر سطح‌زی ریز در خلال سه برنامه پنج ساله توسعه شبیلات، همیشه جزو اهداف کمی تولید درآبهای جنوب بوده است(۶). ساردنین ماهیان جزء گونه‌های سطح‌زی ریز می‌باشند و از طرفی این ماهیان در سواحل و به صورت گله‌های بزرگ در همه دریاها از نصف النهارهای ۷۰° شمالی تا ۶۰° جنوبی یافت می‌شوند(۱۷). این ماهیان به علت دارا بودن رفتار گله‌ای و قابلیت ترکیب شدن با زی توده سایر جمیعت‌ها به آسانی توسط تورهای محاصره ای صید می‌شوند، از این رو آنها را در زمرة منابع اقتصادی قرار می‌دهند(۹). شگ ماهیان به ۶ زیر خانواده تقسیم می‌شوند، که چهار زیر خانواده از آنها در آبهای دریای اعمان یافت می‌شوند(۱۵).

پنج گونه از ساردنین ماهیان جنس Sardinella و یک گونه از جنس Dussumieria در آبهای خلیج فارس و دریای اعمان S. longiceps . S. sindensis . شناسایی شده اند که شامل گونه‌های S. gibbosa . می‌باشند(۵). S. melanura . D. acuta و S. albella . S. zailinge . در ساردنین سند، حدود ۸۸ درصد از کل صید شناورهای پرسایر در آبهای سواحل جاسک را به خود اختصاص داده است(۳). سالانه حدود ۰۱ درصد از کل صید استان هرمزگان راساردنین ماهیان تشکیل می‌دهند(۲). در آبهای خلیج فارس و دریای اعمان روی ساردنین ماهیان مطالعاتی انجام شده است. از آن جمله می‌توان به ایران (۱)، عوفی (۵)، سواری و محمد پور (۴) و Van zailinge (۱۶) اشاره کرد.

در سایر کشورها، Albarwani و همکاران (۷)، Hussain و Khatoon (۱۱)، Milton و همکاران (۱۵) روی برخی از خصوصیات زیستی ساردنین ماهیان مطالعاتی داشته‌اند. از آنجایی که بررسی زمان تخم ریزی، هم‌آوری و نسبت جنسی از گامهای اساسی درجهت بهره برداری مناسب و پویا از ذخایر این آبزی می‌باشد، از این‌رو پژوهش حاضر در این راستا و به منظور نیل به اهداف یاد شده در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای اعمان به اجرا در آمد.

مواد و روش‌ها

این بررسی به مدت ۱۳ ماه از آبان سال ۱۳۸۰ تا آبان ماه ۱۳۸۱ در صیدگاه‌های ساردنین ماهیان در منطقه جاسک از طول جغرافیایی ۵۷°۳۵' در غرب تا طول جغرافیایی ۵۸°۱۰' در شرق انجام شد. تمام نمونه‌ها از صید قایق‌های پرسایر محلی تهیه شدند. بررسی انجام شده به صورت ماهانه بود و هر ماه حدود ۹۰ قطعه ماهی مورد بررسی قرار گرفتند.

نمونه‌ها پس از تهیه از صیدگاه‌های در حال بهره برداری به آزمایشگاه منتقل و با استفاده از کلیدشناسایی فائز (۱۷) از روی مشخصات ریخت شناسی، شناسایی و جایگاه تاکسونومیک^۲ آنها مشخص شد. دقت اندازه در


بالغ کم و بیش در تمام مدت زمان بررسی مشاهده شدند که مراحل رسیده برای تعیین هم‌آوری مورد بررسی قرار گرفتند. هم‌آوری مطلق و نسبی این گونه‌ها محاسبه شد. میانگین و انحراف معیار هم‌آوری مطلق به دست آمده برابر با 18366 ± 9607 و حداکثر آن با طول کل 185 میلی متر به میزان 43136 عدد تخم در ماه اردیبهشت 1381 و حداقل آن برای همین ماهی با طول کل 124 میلی متر به میزان 5472 عدد تخم در ماه اسفند 1380 بود. هم‌آوری نسبی از تقسیم هم‌آوری مطلق بروزن بدنه ماهی به دست می‌آید (جدول ۱). هم‌آوری نسبی براساس ماه بررسی در شکل ۲ آورده شده است. ارتباط طول کل با هم‌آوری مطلق به صورت $y = 3E-0.9x^{0.48}$ به دست آمده که در آن y تعداد تخم و x طول کل می‌باشد (شکل ۳). نسبت جنسی نر به ماده در ماههای مختلف سال تعیین گردید. تعداد

در این روش ماهی‌هایی که تخدمدان آنها در مراحل 4 ، 5 و 6 قرار داشتند به عنوان ماهی‌های بالغ در نظر گرفته شده‌اند.


نتایج

در طول دوره بررسی تعداد 1171 عدد ماهی مورد زیست سنجی قرار گرفته و با استفاده از وزن گناد و وزن ماهی، GSR برای هر ماهی محاسبه شد و میانگین ماهانه آن تعیین و نمودار مربوطه رسم شد. اوج اصلی تخدمزی در اردیبهشت ماه بود و دو اوج دیگر که از اهمیت کمتری برخوردار بودند در تیر و مهر ماه مشاهده شدند (شکل ۱).

در بررسی بر روی تعداد 490 عدد ماهی ماده ساردين سند معلوم شدکه 31 درصد از آنها دارای تخدمدان‌هایی در مرحله 4 و 5 بودند. ماهیان



شکل ۱: تغییرات نسبت گنادوسوماتیک ساردين سند در ماههای مختلف در آبهای منطقه جاسک (۱۳۸۰-۸۱)



شکل ۲: هم‌آوری نسبی ساردين سند در ماههای مختلف در آبهای منطقه جاسک (۱۳۸۰-۸۱)

جدول ۱- هم آوری نسبی و مطلق ساردين سند در آبهای منطقه جاسک (۱۳۸۰-۸۱)

نام گونه	تعداد	میانگین طول (میلی متر)	میانگین وزن (گرم)	میانگین هم آوری مطلق و انحراف معیار	میانگین هم آوری نسبی و انحراف معیار
<i>S. sindensis</i>	۳۷	۱۶۱	۳۵	۱۸۳۶ ± ۹۶۰۷	۵۶۰ ± ۱۸۲

مرحله‌ای^۴ می‌باشد. تخم ریزی چند مرحله‌ای برای گونه‌های کوتاه عمر مفید می‌باشد زیر آنها را قادر می‌سازد تا میزان پایداری جمعیت خود را در محیط‌های ناپایدار حفظ نمایند. در این گونه‌ها، تولید بستگی به مدت زندگی تولید مثلی، زمان بین تخم ریزی‌ها و ساختار تخم جمعیت‌ها بستگی دارد. تغییرات تولید مثلی ماهیان بالغ گونه‌های کوتاه عمر مناطق گرمسیری که دارای مرحله لاروی کوتاه و رشد سریع هستند اثرات مهمی روی نسل تجدیدشونده^۵ آنها دارد (۱۳). از طرفی دو کاهش ناگهانی در تغییرات GSR این گونه مشاهده می‌گردد که اولی در خرداد ماه و ۸۱ دیگری در شهریور ماه ۸۱ دیده می‌شود. این کاهش‌ها احتمالاً خاطر کمبود نمونه و یا ورود گله‌های جدید ساردين ماهیان به منطقه صیدمی باشد (شکل ۴).

در بررسی‌های قبلی اشاره شده که حرکت جمعیت‌های ساردين ماهیان بالغ با گناههای رسیده از ژوئن (تیر ماه) به طرف ساحل آغاز می‌شود و این ماهیان بلا فاصله شروع به تخم ریزی می‌کنند. در بررسی‌های صورت گرفته در خلیج فارس، دوره تخم ریزی برای گونه‌های ساردين مارس تا آوریل (اسفند تا فروردین) و مه تا ژوئن (اردیبهشت تا خرداد) بدست آمده است (۷). در یک دوره ده ماهه از بررسی‌های انجام شده در خلیج فارس معلوم شده است که فصل تخم ریزی ساردين سند از اواسط آوریل (فروردین) تا پایان ژوئن (تیر) می‌باشد (۱۶). بلوغ جنسی این گونه در ماه مه تا ژوئن (اردیبهشت - خرداد) بدست آمده است (۴). بررسی‌های روی پراکنش تخم ساردين ماهیان در آبهای مناطق جنگل‌های حرا

نمونه‌های مورد بررسی که جنسیت آنها تعیین شد ۱۱۷۱ عدد که از این تعداد ۶۱۹ عدد ماده و ۵۵۲ عدد نر بودند و نسبت جنسی (نر : ماده) ۱:۱/۱۲ بود. مطالعه نسبت جنسی طی ماههای مختلف سال متفاوت بود اما مقدار ۲۰٪ های محاسبه شده فقط در ماه آذر ۸۰ و اردیبهشت ۸۱ اختلاف معنی‌داری را نشان داد ($p < 0.05$). در مجموع نسبت جنسی طی دوره ۱۳ ماهه اختلاف معنی‌داری را در سطح قابل انتظار (۱:۱) نشان داد ($p < 0.05$).

با دسته‌بندی طولی ماهی و در نظر داشتن درصد فراوانی مراحل رسیده باروری در هر کلاس طولی نموداری رسم شد که طبق آن نمودار، طول در زمان بلوغ LM_{۵۰} تعیین شد. مقدار LM_{۵۰} برابر با ۱۵۵ میلی متر تعیین گردید (شکل ۴).

بحث

فعالیت تولید مثلی یک ماهی بر اساس تغییرات میانگین GSR ماهیان بالغ تعیین می‌شود (۱۴). نسبت گناد و سوماتیک روش مستقیمی برای تعیین فصل تخم ریزی یک گونه است (۸). مطالعه روند تغییرات ساردين سند در طی دوره بررسی نشان داد که بیشترین مقدار GSR در فصل بهار و در اردیبهشت ۸۱ مشاهده شد. از این رو احتمالاً اوج تخم ریزی در اردیبهشت ماه روی می‌دهد. علاوه بر این دو اوج کوتاه‌تر نیز در تیر و مهر ماه مشاهده گردید (شکل ۴). علت امر شاید این باشد که بسیاری از گونه‌های گرمسیری شنگ ماهیان دارای تخم ریزی چند

جدول ۲- تغییرات نسبت جنسی ماده به نر در ساردين سند در آبهای منطقه جاسک (۱۳۸۰-۸۱)


ماه	آبان ۸۰	آذر ۸۰	دی ۸۰	بهمن ۸۰	اسفند ۸۰	فروردین ۸۱	اردیبهشت ۸۱	خرداد ۸۱	تیر ۸۱	شهریور ۸۱	مهر ۸۱	آبان ۸۱	کل
تعداد ماده	۳۷	۵۹	۵۸	۳۴	۵۸	۶۰	۵۷	۵۲	۶۳	۷	۵۹	۴۶	۶۱۹
تعداد نر	۴۴	۴۴	۳۵	۵۹	۵۹	۶۰	۶۲	۶۹	۵۷	۶	۱۷	۳۲	۵۵۲
نسبت ماده به نر	۱:۱/۱۹	۱:۰/۵۹	۱:۰/۵۲	۱:۰/۷۶	۱:۰/۰۹	۱:۱/۰۹	۱:۱/۰۲	۱:۰/۴۲	۱:۰/۹	۱:۰/۰۶	۱:۰/۵۷	۱:۱/۰۳	۱:۰/۰۷
X _۲	۰/۶	۰/۱۲*	۰/۱۲*	۰/۱۰۶	۰/۲۲	۰/۲۲	۰/۱۰۸	۰/۰۴	۰/۰۸	۰/۰۴	۰/۰۶	۲/۵۲	۳/۸۳

اگر $X > 3/85$ باشد اختلاف در سطح ۰/۰۵ معنی‌دار است.


$$\Delta X_2 = 3/83$$

$$df = 13 - 1$$

$$\alpha = 0/0$$



شکل ۳: ارتباط طول کل با هم‌آوری
مطلق در ساردن سند در آبهای
منطقه جاسک (۱۳۸۰-۸۱)



شکل ۴: طول ماهی ساردن
سند ماده در زمان بلوغ جنسی
در آبهای منطقه جاسک (۱۳۸۰-۸۱)

سطح قابل انتظار (۱:۱) وجود ندارد ($p < 0.05$). از آنجایی که اوج تخم ریزی در ماه اردیبهشت ۸۱ به دست آمد به نظر می‌رسد وجود اختلاف معنی دار نسبت جنسی در ماه اردیبهشت ۸۱ و آذرماه ۸۰ احتمالاً بی ارتباط با رفتارهای تولید مثلی این گونه در فصل تخم ریزی نباشد. بررسی انجام شده بروی ذخایر سطح زی خلیج فارس و دریای عمان در سال ۱۳۶۱ چنین نتیجه شده که در دوران باروری و ماههای قبل از آن، نسبت ماده‌ها در خیلی موقعی بیشتر از نرها است و این نسبت گاهی به ۵۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد اما در دوره‌های دیگر ذخایر نابالغ بود و دارای نسبت جنسی مشخصی نمی‌باشد (۴). یافته‌های پژوهش حاضر تا حدی با تحقیقات قبلی مغایرت دارد. به نظر می‌رسد اختلاف موجود به خاطر تفاوت‌های زیست محیطی و یا رفتارهای تولید مثلی این آبزیان بشد. با استفاده از فراوانی طولی مراحل بلوغ (مراحل ۴، ۵ و ۶) در نمونه‌ها می‌توان به طول ماهی در زمان بلوغ دست یافت. این طول برای گونه مورد نظر ۱۵۵ میلی متر به دست آمد (شکل ۴). براساس مطالعات انجام شده مقدار LC₅₀ (طولی که ۵۰ درصد ماهیان صید شده‌اند) برای این گونه

سوالی ایالت سند پاکستان صورت گرفت معلوم گردید که ۱۷/۲۲ درصد از تخم‌ها در ماههای مارس، آوریل و ژانویه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) درون مناطق جنگلهای حرا و ۴۸/۸ درصد در نوامبر و دسامبر (آبان و آذر) بیرون از مناطق جنگلهای حرا بطرف آبهای آزاد یافت شدند (۱۱). نتایج این تحقیق در مورد فصل تخم ریزی ساردن سند با اظهارات فوق مطابقت دارد.

با مقایسه نمودار GSR (شکل ۴) و میزان هم‌آوری مطلق (شکل ۲) می‌توان مشاهده کرد که همزمان با فصل تخم ریزی، هم‌آوری نیز به حداقل می‌رسد. در نتیجه می‌توان اظهار داشت که احتمالاً رابطه مستقیمی بین میزان هم‌آوری و اوج تخم ریزی وجود دارد (جدول ۵). اظهار Alheit می‌دارد که خانواده شگ ماهیان تغییرات زیادی در هم‌آوری و اندازه تخم دارند (۱۳). هم‌آوری به معنی تعداد تخم‌های آماده رها شدن در ماهی ماده پیش از تخم‌ریزی است. هم‌آوری بین گونه‌ها متفاوت است و وابسته به سن، طول، وزن، شرایط محیطی و غیره می‌باشد (۸).

مطالعه نسبت جنسی نشان داد که در مجموع اختلاف معنی داری در

- ایران. ۱۴۰ میلی متر است (۳). براین اساس با در نظر گرفتن فراوانی ساردنین سند در اندازه‌های بیشتر و کمتر از طول بلوغ این ماهی، می‌توان نتیجه گرفت که ابزار صید مورد استفاده برای صید آن، دارای چشممه‌هایی است که جهت صید مناسب نمی‌باشد. بررسی‌های فائو در دریاچه عمان و خلیج فارس معلوم کرد که ساردنین سند در دوره باروری ۱۱۰-۱۵۰ میلی متر طول دارد (۴). علت تفاوت این مقدار با پژوهش حاضر احتمالاً به بررسی کلاس‌های طولی مختلف و یا ابزار صید متفاوت مورد استفاده در دو تحقیق ارتباط دارد.
- ایران. ۲۹ ص.
- 7- Albarwani, M. A. , A. Parbhakar, J. A. Dorr, M. Almandhery. 1989; Studies on the biology of *Sardinella longiceps* (Val) in the Sultanate of Oman. Kuwait bulle. Scie. pp. 201-209.
- 8- Biswas, S. P. , 1993; Manual of methods in fish biology. South Asian publisher's pvr. LTD. , India,. 157 p.
- 9- Cole, J. ; J. Mc Glade. , 1998; Clupeoid population variability. The environment and satellite imagery in coastal upwelling. Reviews in fish biology and fisheries. No. 8, pp. 445-471.
- 10- Hunter,J. R. ,N. C. H. LO,R. J. H. Leong.1985; Batch fecundity in multiple spawning fishes. inlasker,R. (ed),An egg production method for estimating spawning biomass of fish: Application to the northern anchovy,*Engraulis mordax*, p. 67-77. NOAA Tech. Rep. NMFS 36.
- 11- Khatoon, Z. ; S. M. Hussain. , 1998; Description of eggs and developmental stages of sardinella sp. with notes on their abundance and distribution in the backwaters of Karachi harbour. Pakistan Jour. Zool. , Vol. (30) 2. , pp. 143-149.
- 12- King, M. , 1995; Fisheries biology, assessment and management fishing news books. , vol. 3, no. 5, pp. 151-160.
- 13- Milton, D. A. ; S. J. M. Blaber, N. J. F. Rawlinson. , 1994; Reproductive biology and egg production of three species of clupeidae from kiribati, tropical central pacific. , fish. Bull. , no. 22, pp. 102-121.
- 14- Pet,J. S. ;W. L. T. Van desen; M. A. M. Marchiels, M. Sukkel, D. Steyohadi; A. Tumulyadi. 1997; Length - based of population dynamics and stock identification in the sardine fisheries around east java, Indonesia. Fish. Rese. Bull. , Vol. 31, pp. 107-120.
- 15- Randal,J. E. ,1995; The complete divers and fisherman's guide to coastal fishes of Oman. University of Hawaii press. 439p.
- 16-Van zaling, N. P. ; F. Owfi; S. Ghasemi; K. Khorshidian; N. Niamaimandi. , 1993; Resources of small pelagics in Iranian waters, a review. FAO/ UNDP fisheries development project Ira/ 83/013: 370p.
- 17-Whitehead, P. J. P. , 1985; FAO species catalogue. Vol. 7, Clupeoid fishes of the world (Super order clupeoidei). FAO fishes synopsis. , no. 1125, vol. 7, part 1.

در منطقه جاسک ۱۴۰ میلی متر است (۳). براین اساس با در نظر گرفتن فراوانی ساردنین سند در اندازه‌های بیشتر و کمتر از طول بلوغ این ماهی، می‌توان نتیجه گرفت که ابزار صید مورد استفاده برای صید آن، دارای چشممه‌هایی است که جهت صید مناسب نمی‌باشد. بررسی‌های فائو در دریاچه عمان و خلیج فارس معلوم کرد که ساردنین سند در دوره باروری ۱۱۰-۱۵۰ میلی متر طول دارد (۴). علت تفاوت این مقدار با پژوهش حاضر احتمالاً به بررسی کلاس‌های طولی مختلف و یا ابزار صید متفاوت مورد استفاده در دو تحقیق ارتباط دارد.

تشکر و قدردانی

ضمن تشکر از مساعدت دکتر استکی رئیس پژوهشکده، برخود لازم می‌دانیم از همکاری مهندس رامین کریم زاده و آقای علی صحابی به خاطر شرکت در عملیات نمونه برداری و همچنین راهنمایی‌های مهندس عبدالمهندی ایران نهایت تشکر و امتنان به عمل آید.

پاورقی‌ها

- 1-Clupeoidea
- 2- Taxonomic
- 3- Gonado-Somatic Ratio
- 4- Multiple spawners
- 5-Recruitment

منابع مورد استفاده

- ۱ - ایران، ع. ، ۱۳۶۷. گردآوری و بررسی آمار صید ماهیان سطحی ریز (ساردنین ماهیان) در جنوب کشور(در فصل صید ۷-۱۳۶۶-۱۳۶۷). مرکز تحقیقات شیلات دریای عمان.
- ۲ - خورشیدی، ص. ، ۱۳۸۲. گزارش آمار صید سال ۱۳۸۱ استان هرمزگان. اداره کل شیلات استان هرمزگان. ۳۹ ص.
- ۳ - سالارپور، ع. ، ا. کامرانی، غ. زرشناسی، م. درویشی، ک. جوکار، ر. کریم زاده، ع. صحابی، ع. ایران، ۱۳۸۲؛ بررسی وضعیت صید سطح زیان ریز (ساردنین ماهیان) در منطقه جاسک و ارتباط آن با پارامترهای هیدرولوژیک. پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان. ۶۴ ص.
- ۴ - سواری، ا.، م. محمد پور، ۱۳۶۱، ذخایر سطحی خلیج فارس و دریای عمان (ترجمه). مرکز تحقیقات و توسعه ماهیگیری خلیج فارس (بوشهر).
- ۵ - عوفی، ف. ، ۱۳۷۰؛ ساردنین ماهیان خلیج فارس و دریای عمان. مرکز تحقیقات و آموزش شیلاتی خلیج فارس - بوشهر.
- ۶ - مدیریت طرح و برنامه، ۱۳۸۰؛ برنامه پنج ساله سوم توسعه مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، شرکت سهامی شیلات ایران. انتشارات مؤسسه تحقیقات شیلات

