

بررسی آلودگی به تلاریا در چشم نیشخوارکنندگان در کشتارگاه شهرستان ارومیه

● موسی توسلی، دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپردازی دانشگاه ارومیه
● میررسول روضه‌نی، دامپردازی دانشگاه ارومیه

تاریخ دریافت: آذر ماه ۱۳۸۰ تاریخ پذیرش: آبان ماه ۱۳۸۱

مقدمه

گونه‌های مختلف تلاریا در روی چشم پستانداران و پرندگان زندگی و در داخل مجرای اشکی، کیسه‌های متلحمه و یا زیر بلک سوم مستقر می‌شوند. اغلب آنها انگل حیوانات و حشری می‌باشند. فقط دو گونه تلاریا از انسان گزارش شده است (۷)، مگس‌های جنس موسکا میزبان واسط این کرم می‌باشند (۷)، مراحل نوزادی این کرم در داخل تخم‌دان، سر و خرطوم میزبان‌های واسط دیده می‌شوند (۱۴). این مگس‌ها بر روی صورت اسب، گاو و حیوانات دیگر قرار گرفته و از ترشحات جشم‌مان آنها تغذیه می‌نمایند و باعث آزار و اذیت حیوانات می‌شوند (۵). تورم متلحمه چشم، پریش اشک، پرخونی چشم، کدورت قرنیه و زخم قرنیه، بیرون ریختن محتویات اطاق قدامی چشم، التهاب یا ابتلای شدید چشم، اکسودا، چرکی شدن چشم و درد علانم آلودگی با تلاریا می‌باشد (۱۵). جراحات تولید شده در اثر پوست فشرده و مضرس کرم و هم چنین و همچنین حرکت کرم‌های جوان در چشم به وجود می‌آید (۱).

مواد و روش کار

در یک دوره دو ساله جهت تعیین آلودگی چشم نیشخوارکنندگان در زمان ذبح دامها به کشتارگاه شهرستان ارومیه مراجعه و پس از ذبح دام به دلیل عدم امکان خارج ساختن چشم با استفاده از پیست آزمایشگاهی حاوی سرم فیزیولوژی به طور تصادفی چشم دامهای ذبح شده را به خوبی شستشو می‌دادیم. برای این کار ابتدا سوند پیست را در راویه خارجی چشم قرار داده و با فشار دست سرم فیزیولوژی را با فشار وارد

چکیده

در یک فاصله زمانی دو ساله از چشم ۴۰۳ رأس گاو، ۴۱۷ رأس گامیش، ۳۸۱ رأس گوسفند و ۲۱۴ رأس بز از سن و جنسهای مختلف در کشتارگاه ارومیه برای مشخص نمودن آلودگی به کرم چشم (تلاریا) نمونه برداری شد. در این بررسی از چشم گاو و گامیشهای کشتاری تلاریا *T. lacrymalis* و *The larazia rhodesii* تا ۱۶٪ نتایج مشخص نمود که آلودگی به *T. rhodesii* در *T. lacrymalis* بیشتر می‌باشد. این حیوانات ۱۶٪ گاوها و ۱.۶٪ گامیشهای آلوده به انگل تلاریا از بزها و گوسفندان تحت بررسی به انگل تلاریا آلود نبودند.

کلمات کلیدی: *Thelazia rhodesii*, *T. lacrymalis*, کرم چشم، گامیش، کرم چشم

✓ پژوهش & سازندگی، № ۵۶ و ۵۷ پ پ: ۴۷-۴۹
Eyeworm infestation of ruminants at Urmia abattoir in West Azarbaijan of Iran.
By: Tavassoli, M & Rozehii, M. R. Department of Pathobiology Faculty of Veterinary Medicine Urmia University Urmia Iran

For a period of two years a total number of 403 cattle 417 buffaloes, 381 sheep and 214 goats of different ages and sexes were examined for eyeworm infestation at Urmia abattoir. *Thelazia rhodesii* and *T. lacrymalis* were found in cattle and buffaloes, while *T. rhodesii* was the most prevalent species. The rate of infestation in the cattle and buffaloes eyes were 16.12% and 1.62% respectively. No infestation were observed in examined sheep and goats

Keywords: *Thelazia rhodesii*, *T. lacrymalis*, Cattle, Buffalo, Eye worms

میلی متر با میانگین ۱۲/۵ میلی متر و حداقل و حداکثر اندازه کرم‌های نر *T. lacrimalis* ۰-۵/۵-۷/۵ میلی متر بود. میانگین طول اسپیکول چپ کرم‌های نر ۷/۷۵ میلی متر بود. میانگین طول اسپیکول چپ کرم‌های نر ۱۷۰ میکرون و میانگین طول اسپیکول راست ۱۱۵ میکرون بود (جدول شماره ۴) نتایج بدست آمده در این بررسی با آزمون مربع کای مورد ارزیابی قرار گرفت.

بحث

آلودگی به گوشه‌های مختلف تلازیا از نقاط مختلف و از حیوانات مختلف گزارش شده است. از ۷۹۷ چشم‌گاو آزمایش شده در ماساچوست تعداد ۹۷ چشم آلود به *T. glauca* و ۸ چشم آلود به *T. skrjabini* به هر دو گونه آلود بودند (۴). از ۳۲۰ رأس گاو ناحیه ایندیانا ۸۸ رأس آلود به *T. skrjabini* و *T. giuca* بودند و گواهای سه ساله بیشترین آلودگی را داشتند (۱۰). از ۸۹ اسب نمونه برداری شده در کنترال امریکا ۷۷ مورد آلود به *T. lacrimalis* و دو مورد آلود به *T. skrjabini* بودند (۱۱). آلودگی انسان در یک پسر ۱۰ ساله از اندونزی و یک پسر یک ساله از تایلند گزارش شده است (۹، ۱۶).

از ۳۱۴ قلاهه سگ در ایتالیا ۴۴ نمونه متعلق به گونه *T. cali* چداد شد (۱۲).

در بررسی‌های انجام شده در ایران، عبادی در بررسی ۳۱۵° رأس گاو ۱۲۰ رأس آلود به *T. rhodesii* و *T. lacrimolis* (۲)، همچنین تووفی افسار راز گاو و *T. lisei* راز گاو و *T. rhodesii* (۳). جراحات حاصل از آلودگی ممکن است در یک یا هر دو چشم دیده شود که معمولاً با کوتزنگتیویت مختصر همراه است و ممکن است هجمونالد بافت ملتحمه و قرنیه و ریزش اشک بروجود آید. در آلودگی شدید قرنیه کدر و زخم می‌شود (۱). در اثر آلودگی به *T. rhoalesis* کرم ۱۲۷ کرم شدید گزارش شده است (۱۳). حداکثر کرم جدا شده از گاو در این بررسی ۳۴ عدد بود، بدنهای کرم این تعداد کرم می‌تواند مسئول ایجاد عوارض چشمی باشد. بدین دلیل در عوارض چشمی در گاو و گاومیش‌های منطقه باید به آلودگی به این انگل نیز توجه نمود.

شیوه آلودگی به تلازیا فصلی است و با فصل فعالیت میزانهای واسطه همانگی می‌باشد. در بررسی ۲۹۷ رأس گاو در الیتراتی مرکزی در کانادا شیوه بیماری در بیشترین مقدار را داشته است (۸). در بررسی مشابه در رامبیا بیشترین آلودگی در فصل بارانی با ۲۶٪ و کمترین آلودگی در فصل خشک بود (۸). نتایج این بررسی مؤید آن است که در سطح $p < 0.05$ اختلاف معنی داری بین فصول مختلف سال و میزان آلودگی وجود دارد بطوریکه بیشترین میزان آلودگی در فصل پائیز و کمترین میزان آلودگی در فصل زمستان می‌باشد. در ارتباط با اختلاف آلودگی بین سنتین زیر دو سال و بالای دو سال بد انگل در سطح معنی دار $p < 0.05$ اختلاف معنی دار بود به طوریکه دامهای بالای دو سال بیشتر از دامهای زیر دو سال آلود بودند. بررسی مشابه در رامبیا مرکزی نیز، گاوان مسن نسبت به گوسالدها

فصل	نوع دام	دام	کار شده	تعداد نمونه آلود%	سن زیر دو سال	تعداد نمونه آلود%	سن بالای دو سال	تعداد نمونه آلود%
پاییز	گاو	گاو	۱۱۹	۲۲	۶۰	۱۶	۵۹	۱۷
	گاومیش	گاومیش	۱۲۸	۲	۲۵	۱	۱۰۳	۲
	گاو	گاو	۷۵	۳	۷۰	۷۰/۷۲	۷۱/۴۴	۷/۱۴/۲۸
زمستان	گاو	گاو	۸۵	۶	۲۸	۲	۵۷	۳/۲/۵۲
	گاومیش	گاومیش	۷۵	-	۱۶	-	۵۹	-
	بیمار	گاو	۷۴	۶	۲۷	۵	۴۷	۱/۱/۲۵
بهار	گاو	گاو	۸۸	۳	۲۶	۱	۶۲	۲
	گاومیش	گاومیش	۱۱۶	۱	۲۵	-	-	۷/۲/۲۶
	تابستان	گاو	۷۴	۶	۲۷	۵	۴۷	۱/۱۰/۱۴
جمع آمار سالانه	گاو	گاو	۴۰۳	۶۵	۱۵۷	۲۱	۲۴۶	۲۴/۷۴۳
	گاومیش	گاومیش	۴/۱۷	۷	۱۱۲	۲	۳۰۵	۵
	آمار سالانه	آمار سالانه	۷/۱/۱۹	۷/۱/۴۷	۷/۱/۴۷	۷/۱/۴۷	۷/۱/۴۷	۷/۱/۱۹

چشم می‌نمودیم و تمام محتویات و ترشحات زاویه خارجی، زاویه داخلی، داخل پلک سوم، کیسه ملتحمد بالایی و پائینی را کامل‌اشتتشو می‌دانیم و مایعات جمع اوری شده را جداگانه در داخل ظرف نمونه گیری ریخته، به آزمایشگاه انتقال می‌دانیم. در آزمایشگاه نمونه را در لولهای آزمایش مخوطی ریخته و بی‌دور ۲۰۰۰ بد مدت ۵ دقیقه سانتریفیوز نموده و رسوب حاصله را در زیر لوب بررسی و با استفاده از سوزن کرم جمع کنی انگل‌ها را جمجم اوری می‌نمودیم. برای تشخیص انگل در زیر میکروسکوپ انگل را روی لام قرار داده و با اضافه نمودن یک قطره لاکتوتفول به آن و قرقر دادن لام بر روی آن در زیر میکروسکوپ گونه انگل را تشخیص می‌دانیم. در این بررسی از چشم ۴۰۳ رأس گاو و ۴۱۶ رأس گاومیش، راس ۳۸۱، رأس گوسفند و ۲۱۴ رأس بز نمونه‌برداری انجام شد و سن و جنس آنها یادداشت می‌شد.

نتایج

از ۴۰۳ رأس گاو نمونه برداری شده آلودگی به تلازیا در ۶۵ رأس (۱۶/۱۲) دیده شد. رأس از گواهای زیر دو سال و رأس بالای دو سال بودند. که به ترتیب آلودگی در ۳۱ رأس (۷/۶/۸)، ۳۴ رأس (۷/۶/۴۲) و ۱۹ رأس (۷/۱۶/۱۲) مشاهده گردید. از ۴۰۳ رأس گاو ۶۵ رأس به ترتیب به انگل تلازیا بودند (جدول شماره ۱ و ۲) در میان گواهای آلودگی ۲۸ رأس (۶/۶/۹۴) آلود بود در میان گواهای آلودگی ۳۴ رأس (۸/۴۲) آلود بود به سه رأس آلودگی توانم بده *T. lacrimalis* و *T. rhodesii* حداقل و حداکثر اندازه *T. rhodesii* ۷-۲۱ ماده داری اندازه *T. rhodesii* میلی متر با میانگین ۱۴ میلی متر و حداقل و حداکثر اندازه کرم‌های نر ۱۴-۵ میلی متر با میانگین ۹/۵ میلی متر بود. میانگین طول اسپیکول چپ کرم‌های نر ۲۲۸ میکرون و میانگین طول اسپیکول چپ کرم‌های نر ۱۲۹ حداقل و حداکثر اندازه *T. lacrimalis* ماده ۶-۱۹ میلی متر بود.

جدول ۲- درصد آلودگی کاو به تلازیا بر اساس نژاد در شهرستان‌های ارومیه

فصل	نژاد	تعداد نمونه	تعداد نمونه آلوده	درصد آلودگی
پاییز	اصیل	۴۵	۱۳	%۱۹۲
زمستان	بومی و دورگاه	۷۴	۳۰	%۱۶۸
بهار	اصیل	۲۰	۴	%۲۷
تابستان	بومی و دورگاه	۶۵	۲۲	%۲۳۵
آمارسالیانه	اصیل	۲۰	۴	%۲۷
	بومی و دورگاه	۴۹	۴	%۱۷
	اصیل	۲۵	-	-
	بومی دورگاه	۱۰۰	۲۰	%۱۶
	اصیل	۱۱۵	۲۱	%۱۲
	بومی و دورگاه	۲۸۸	۴۴	%۱۰/۹۱

آلودگی بیشتری داشتند (۶). اختلاف معنی‌دار بین نژادهای مختلف و میزان آلودگی در گاوهای حود نداشت.

مراجع مورد استفاده

15- Soulsby, E. J.L. 1982. Helminth, arthropoda and protozoa of domesticated animals. Baillier Tindall pp: 289-290.

16-Yospaiboon, Y. Sithithavorn, P. Malee, W, Ukosanakran U, Bhaibulaya, M. 1989. Ocular thelaziasis in Thailand: A case report. J. Med Assoc. Thai. 72(8), PP: 467-73.

worms (Nematoda: thelazioidea) in beef cattle grazing different range pasture zones in Alberta, Canada. J. Parasitol. 79(6). PP: 866-9.

9- Kosin, E., Kosman, M.L. & Depary, A. A. 1989. First case of human thelaziasis in Indonesia, Southeast Asian. J. Trop. Med. Public. Health, 20(2) P: 233-6.

10- Ladouceur, C. A. & Kasacos, K. R. 1981. Eyeworms in cattle in Indiana. J.A.M. Vet. Med. Assoc, 178(4). p 385-90.

11- Lyons, E.t. Tolliver, S.C, Drudge, J. H Swerczek, T.W. & Crowe, M. W. 1985. Prevalence of some internal parasites recovered at necropsy of thoroughbreds born in Kentucky Am j Vet Res. 46(3). PP: 679-83.

12- Rossil, Betraglia, P.P. 1989. Presence of *Thelazia callipaeda* Railliet and Henry, 1910, in piedmont, Italy. Passitologia. 31 (2-3) pp: 167-72.

13- Salifu, D.A, Haruna, E. S. & Makinde, A. A. 1990. A case report of thelazia infection in a 15 month old heifer, plateau state, Nigeria. Rev. Elev. Med. Vet. pays Trop. 43(2). PP: 197-8.

14- Skrjabin, K.I., Sobolev & Ivashkin, V.M. 1967. Spirurata of animals and man and the diseases caused by them part 4 Thelazioidea. PP: 12-20, 41-44.

۱- اسلامی علی, ۱۳۷۷. کرم‌شناسی دامپزشکی جلد سوم کرم‌های کرد و آکانتوسوفلا. انتشارات دانشگاه تهران صفحات ۵۲۶-۵۲۹

۲- عبادی عبدالله. ۱۳۴۰. بررسی انواع تلازیاهای چشم گاو در کشتارگاه تهران. پایان نامه برای دریافت دکتری دامپزشکی از دانشگاه تهران: شماره ۴۲۸

۳- ونوقی افشار علیرضا. ۱۳۵۵. بررسی انواع تلازیاهای چشم نشخوارکنندگان در کشتارگاه تهران پایان نامه برای دریافت دکتری دامپزشکی از دانشگاه تهران. شماره ۱۰۹۱

4- Geden Cj & Stoffolano JG, Jr. 1980. Bovine thelaziasis in Massachusetts. Cornell vet. 70(4). PP: 344-59.

5- Georgi, I.R & Georgi, M.E. 1990. Parasitology for veterinarian., W.B Saunders Company., Fifth Edn.

6- Ghirotti, M & Iiampu, D.S. 1989. *Thelazia rhodesii* (Desmarest, 1828) in cattle of central province, Zambia parasitologia. 31 (2-3). pp: 231-7.

7- Ghrald, D.S. & Larry, R. 1989. Foundation of parasitology, Forth Edn. pp: 479.

8- Kennedy, Mj. 1992. Prevalence of eye