

خودآزمائی «جراحی دامپزشکی»

۱۵- در تک سُمی‌ها هنگام استفاده از پنس بوردیزو جهت اخته کردن باید چه محالی را انتخاب و به چه صورت این عمل را انجام داد؟

□ الف- ۲ سانتیمتر بالاتر از بیضه و هر بند بیضه به صورت جدا گانه

□ ب- ۵ سانتیمتر بالاتر از بیضه و هر بند بیضه به صورت جدا گانه

□ ج- ۵ سانتیمتر بالاتر از بیضه و هر دو بند باهم

۱۶- برای عمل اوواریکتومی در دامهای بزرگ از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

Emasculator

Weingart-set

Ecrazor

Trephine

۱۷- در سازارین گاو معمولاً طول شکاف چقدر بوده و چه محالی را روی رحم انتخاب کرده و معمولاً از چه بخشی‌ای در رحم استفاده می‌شود؟

□ الف- ۳۰ سانتیمتر، انحنای بزرگ، ساده تک تک

□ ب- ۲۰ تا ۱۵ سانتیمتر، انحنای بزرگ، کوشینیگ

□ ج- ۱۰ سانتیمتر، انحنای کوچک، لمبرت

□ د- ۲۰ سانتیمتر، انحنای کوچک، ساده تک تک

۱۸- در پرولاپس مقعد و رکtom جهت کاهش خیز عضو، در اولین مرحله چه اقدامی صورت می‌گیرد؟

□ الف- شستشو با پاوبیدین پداین

□ ب- شستشو با محلول سرم نمکی

□ ج- استفاده از بmad و آنتی‌بیوتیک روغنی

□ د- هیچکدام

۱۹- در برخورد ثانویه با جراحت و زخم کدامیک از اعمال زیر انجام می‌شود؟

□ الف- شستشوی زخم

□ ب- بخیه زدن در ناحیه جراحت

□ ج- پیوند پوست

□ د- هیچکدام

۲۰- در هنگام مواجهه با زخم و جراحت، زمان طلایی "Golden Period" در کدام مرحله برخورد با زخم بندی می‌شود؟

Primary

Secondary

Tertiary

□ د- هیچکدام

• تهیه و تنظیم از: دکتر محمد رضا قلمه‌نویس
عضو هیأت علمی دفتر طرح و برنامه‌ریزی و هماهنگی امور پژوهشی

پاسخ در صفحه ۱۴۴

بیحس کننده موضعی انجام می‌شود؟

□ الف- استفاده از داروهای تنگ کننده عروق

□ ب- استفاده از آنزیم هیالورونیداز

□ ج- افزایش غلظت دارو

□ د- همه موارد فوق

۹- در روند بیهوشی، زمان ایجاد بیهوشی در کدامیک از مراحل اتفاق می‌افتد؟

□ الف- مرحله ۱ و ۲ بیهوشی

□ ب- مرحله ۳ و بیهوشی

□ ج- مرحله ۴ و بیهوشی

□ د- مرحله بیهوشی

۱۰- زمان انجام جراحی (Surgical time) در کدام مرحله بیهوشی بوده و شامل چند Plan است؟

□ الف- مرحله II و سه پلان

□ ب- مرحله I و ۴ پلان

□ ج- مرحله III و ۴ پلان

□ د- مرحله IV و سه پلان

۱۱- جهت رفع عوارض پاراسمپاتومیتیکی داروی گریازین هیدروکلراید از کدامیک از داروهای زیر استفاده می‌شود؟

□ الف- ادرنالین

□ ب- استیل پروماین

□ ج- سولفات اتروپین

□ د- لیدوکائین

۱۲- در حالتی که گوساله و کره تازه متولد شده بر روی مفصل قلمی انگشتی راه رفته و ترسطحی اندام مبتلا متأثر شده باشد، چه درمانی پیشنهاد می‌شود؟

□ الف- تنوتومی

□ ب- گچ‌گیری ساده عضو

□ ج- الف و ب

□ د- هیچکدام

۱۳- ناحیه بطنی دامی بر جستگی داشته و بیرون زده، در دنای کوگرم است و فاقد پرده سفاقی بوده و فقط لایه‌ای از پوست روی اعضاء بیرون زده و سطح ناحیه را پوشانده، با توجه به تعاریف کدامیک از اصطلاحات زیر در این حالت مصدق پیدا می‌کند؟

Hematoma

Hernia

Eventration

Abcess

۱۴- در تک سُمی‌ها، برای کاهش عصیت دام معمولاً در چه سنی اخته کردن انجام می‌شود؟

□ الف- ۶۰ ماهگی

□ ب- ۲۴ ماهگی

□ ج- ۱۰ ماهگی

□ د- ۲ ماهگی

۱- پدیده ترمیم "Regeneration" در کدامیک از اندامهای زیر در پستانداران اتفاق می‌افتد؟

□ الف- مغز و قلب

□ ب- قلب و کبد

□ ج- پوست و کبد

□ د- پوست و قلب

۲- در فرآیند التیام "Healing" مونوستیت‌ها در کدامیک از مراحل، به موضع آمد و ایفای نقش می‌کنند؟

□ الف- Traumatic inflammation

□ ب- Proliferation

□ Debridement

□ ج- Destruction

□ د-

۳- حذف جوانه شاخی گوساله در چه سنی مناسب‌تر است؟

□ الف- تا ۲۰ هفتگی

□ ب- تا ۸ هفتگی

□ ج- تا ۱۰ هفتگی

□ د- تا ۶ هفتگی

۴- کدامیک از اصطلاحات زیر در مورد ورود به حفرات بدن از طریق شکاف به جدار حفره صحیح‌تر است؟

□ الف- لاپاراتومی

□ ب- رومینوتومی

□ ج- لارنکوتومی

□ د- سیلوتومی

۵- در مورد آپونوروز بهتر است از چه نوع بخیه و نخی استفاده شود؟

□ الف- تشکی عمودی سنج خاکی

□ ب- زنجیری سراسری سنج خاکی

□ ج- زنجیری سراسری، سنج خاکی

□ د- تشکی عمودی، سنج خاکی

۶- کدامیک از بخیه‌های زیر در پوست بیشتر استفاده می‌شود؟

□ الف- سراسری ساده

□ ب- سراسری زنجیری

□ ج- تشکی عمودی

□ د- ساده تک تک

۷- برای اعضاء توخالی و امعاء و احشاء کدامیک از بخیه‌های زیر استفاده می‌شود؟

□ الف- لمبرت

□ ب- ساده سراسری

□ ج- منفرد تشکی عمودی

□ د- تشکی سراسری

۸- برای کدامیک از اعمال زیر تاثیر بیشتر داروهای