

## اثر کادمیوم در حضور غلظت‌های مختلف نمک NaCl بر روی شاخص‌های رشد در جلبک سبز تک سلولی *Dunaliella salina*

• سیما یحیی آبادی،

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

• منصور شریعتی،

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

تاریخ دریافت: خرداد ماه ۱۳۸۴      تاریخ پذیرش: آذر ماه ۱۳۸۴

Email: Sima-yah@yahoo.com

### چکیده

یک جلبک سبز تک سلولی می‌باشد. اثر کادمیوم در حضور غلظت‌های مختلف نمک کلریدسدیم شاهد (غلظت ۱ مولار) و ۱/۵ و ۲ مولار بر شاخص‌های رشد (تعداد سلول و میزان کلروفیل کل) در سویه ایرانی جلبک سبز *D. salina* به مدت ۳۶ روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش در غلظت نمک موجب کاهش اثرات تخریبی کادمیوم بر تعداد سلول و میزان کلروفیل کل سلول‌های *D. salina* می‌گردد. به نظر می‌رسد که کاهش تأثیر کادمیوم در نرخ رشد و میزان کلروفیل کل با افزایش غلظت نمک به علت تشکیل  $\text{CdCl}_2$  و جذب کمتر کادمیوم توسط سلول می‌باشد.

**کلمات کلیدی:** *D. salina*, کادمیوم, کلروفیل, کلریدسدیم

Pajouhesh & Sazandegi No 74 pp: 118-122

**Effect of cadmium (Cd) at different concentrations of NaCl on growth rates in unicellular green alga *Dunaliella salina***

By: S. Yahyaabadi. Islamic Azad University of Falavarjan and M. Shariati, Dept. of Biology, University of Isfahan  
*D. salina* is a unicellular green alga. The individual effects of Cd<sup>2+</sup> (0.5 mg.L<sup>-1</sup>) at different concentrations of NaCl (1, 1.5 and 2M) on the growth (cell number and total chlorophyll content) of Iranian strain of *Dunaliella salina* were examined during 36 days of treatment. The results show that increase in salt concentration caused significant increase in cell number and chlorophyll content of *D. salina*. It seems such increase in growth rates is due to formation of CdCl<sub>2</sub> and decrease of uptake of Cd<sup>2+</sup> by cells.

**Keywords:** *D. Salina*, Cadmium, Chlorophyll, Nacl.

تأمین گردد (۳). تأثیر کادمیوم در حضور غلظت‌های مختلف نمک NaCl بر روی تعداد سلول هر دو روزیکبار با شمارش سلول توسط هموسایتومتر (۶) مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین میزان کلروفیل ۵ میلی لیتر از سوسپانسیون جلبکی به یک لوله آزمایش منتقل و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ E-1-west Germany SIGMA3 در دور ۵۰۰۰ دقيقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ گردید. سپس محلول رویی خارج و به رسوب حاصله، ۵ میلی لیتر استون ۸۰ درصد اضافه و مخلوط گردید. مجدداً عمل سانتریفیوژ تکرار و محلول رویی استخراج گردید و با استفاده از اسپیکتروفوتومتر VASPEC ، LKB ، Pharmacia ، U.K. میزان جذب در طول موج‌های ۴۱۲، ۴۶۰، ۴۸۰ نانومتر قرائت و میزان کلروفیل بحسب میکروگرم بر میلی لیتر و پیکوگرم بر سلول مورد محاسبه قرار گرفت (۴). نتایج بدست آمده در این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار و با استفاده از نرم افزار آماری Minitab و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و با استفاده از آزمون Wilk's λ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

### نتایج و بحث

مقدار کلروفیل و تعداد سلول از شاخص‌های فیزیولوژیک جهت بررسی استرس‌ها می‌باشد (۹، ۱۰). باعنایت به گسترش فرازینه‌داری کاربرد فلاتر سنگین و از جمله کادمیوم، بررسی تأثیرات عنصر بر روی متabolیسم و شاخص‌های فیزیولوژیک سلول‌های زنده از اهمیت خاصی برخوردار است (۱۱، ۱۲). در این تحقیق غلظت کادمیوم به نحوی انتخاب گردید که اثرات کشنده‌گی شدید نداشته باشد. بدین منظور سوسپانسیون‌های جلبکی با غلظت‌های صفر، ۰/۱، ۰/۵، ۰/۷ و ۰/۹ میلی گرم در لیتر کادمیوم با وجود منحنی رشد غلظت ۵/۰ میلی گرم در لیتر کادمیوم که در آن غلظت، ۵۰ درصد سلول‌ها بقای خود را حفظ می‌نمایند انتخاب گردید (جدول ۱) و اثر غلظت‌های مختلف نمک در حضور کادمیوم بر روی شاخص‌های رشد (تقسیم سلولی و کلروفیل کل) در جلبک سبز تک سلولی Dunaliella salina بررسی گردید. گزارشات نشان میدهد که در غلظت ۵/۰ میلی گرم در لیتر کادمیوم ۵۰ درصد سلولهای جلبک Dunaliella salina قادر به ادامه رشد می‌باشند (۱۶). جدول ۲، میانگین تعداد سلول سویه ایرانی جلبک سبزتک سلولی Dunaliella salina را در شاهد (غلظت ۱ مولار) و غلظت‌های ۱/۵ و ۲ مولار نمک در حضور غلظت ۵/۰ میلی گرم در لیتر کادمیوم در طی ۳۶ روز آزمایش نشان می‌دهد. طبق نتایج حاصله مشاهده می‌گردد که با افزایش غلظت نمک، یون‌های کادمیوم اثر کشنده‌گی کمتری بر روی سلول دارد و تعداد سلول نسبت به شاهد بطور معنی‌داری (با توجه به جدول آماری (۳) کاهش کمتری نشان می‌دهد که این اختلاف در روز ۱۲ خصوصاً در غلظت ۲ مولار نمک مشهودتر است. به نظر می‌رسد کاهش در میزان مرگ و میرسلول‌ها با افزایش غلظت نمک در حضور غلظت ۵/۰ میلی گرم در لیتر کادمیوم، احتمالاً به علت کاهش فرم آزاد یون کادمیوم ناشی از وجود NaCl و افزایش کادمیوم به صورت  $\text{CdCl}_2$  و در نتیجه کمتر جذب شدن آن توسط سلول‌ها باشد (۱۳). جدول ۴ میانگین کلروفیل کل را بحسب میکروگرم در واحد حجم (میلی لیتر) و بحسب پیکوگرم بر سلول نشان می‌دهد. همانگونه که مشاهده می‌گردد با افزایش غلظت

### مقدمه

یک جلبک سبز تک سلولی از شاخه Dunaliella راسته Volvocales و تیره Chlorophyceae می‌باشد. مشخصه خاص گونه‌های این جنس، رشد در محیط‌های نمکی با غلظت زیاد می‌باشد (۷ و ۱۰). میزان کلروفیل تحت تنشی‌های مختلف در سلول‌های گیاهی تعییرمی کند، برای مثال گزارش شده است که تحت تأثیر افزایش مس، کادمیوم و سرب میزان کلروفیل در واحدهای فتوسنتزی کاهش یافته است (۱۷). کادمیوم یکی از فلزات سنگین می‌باشد که در غلظت‌های در حد میلی مولار و در زمان‌های طولانی، اثرات سمی متنوعی از خودنشان میدهد از جمله ممانعت از سنتز DNA، RNA، پروتئین، ممانعت از فعالیت آنزیمها (۱۵، ۱۴، ۲). علیرغم اینکه کادمیوم از عناصر ضروری جهت رشد جلبک D. salina محسوب نمی‌شود ولی جذب این عنصر توسط سلول بیانگر وجود راههای جذب این عنصر از طریق کانال‌ها و منافذ جذب عناصر دیگر می‌باشد. برای مثال کادمیوم به راحتی می‌تواند از طریق کانال‌های کلسیم عبور کند زیرا اندازه شعاع یونی کلسیم ( $0.99\text{\AA}$ ) و کادمیوم ( $0.97\text{\AA}$ ) و بار الکتریکی آنها مشابه است (۲). به نظر می‌رسد که وجود کادمیوم در محیط سلولی و سنتز کلروفیل اثر می‌گذارد که با افزایش غلظت نمک این اثرات کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از اثر کادمیوم در حضور غلظت‌های مختلف نمک بر شاخص‌های رشد در جلبک D. salina می‌تواند به عنوان یک مدل مناسب در مطالعات فیزیولوژی گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.

### مواد و روش‌ها

سویه ایرانی جلبک سبز تک سلولی D. salina جدا سازی شده از بالاق گاوخونی اصفهان از کلکسیون گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان تهیه گردید. ابتدا جلبک‌ها در محیط کشت Johnson و همکاران (۸) شامل ۵ میلی مولار  $\text{CaCl}_2$ ، ۵ میلی مولار  $\text{KNO}_3$ ، ۰/۲ میلی مولار  $\text{MgSO}_4$  و ۰/۲ میلی مولار  $\text{FeCl}_3 + \text{Na}_2\text{EDTA}$  و ۷ میلی مولار  $\text{KH}_2\text{PO}_4 + \text{ZnCl}_2$  و  $\text{MnCl}_2$  و  $\text{CuCl}_2$  و  $\text{MoO}_4^{2-}$  و  $\text{NH}_4\text{Cl}$  و  $\text{NaHCO}_3$  در pH ۷/۵ و در غلظت ۱۰ میلار نمک در رژیم شبانه روزی ۱۴ ساعت نور و ۱۰ ساعت تاریکی باشد نور ۱۰۰ میکرومول فوتون برمتر مربع بر ثابت و در دمای  $27 \pm 2^\circ\text{C}$  درجه سانتی گراد کشت گردیدند (۱۳). جهت تنظیم شدت نور از دستگاه Quantum Sensor Qspar، U.K استفاده گردید. در مرحله بعد جهت اجراء آزمایش تلقیح سوسپانسیون‌های جلبکی در اواسط فاز رشد لگاریتمی در شرایط کاملاً استریل به ارلن‌های محیط کشت به گونه‌ای انجام شد که غلظت ۰/۵ میلی گرم در لیتر کادمیوم با استفاده از  $\text{CdCl}_2$  برای شاهد و غلظت‌های ۱/۵، ۱ و ۲ مولار NaCl و تعداد جلبک به میزان تقریبی  $2.4 \times 10^6$  در هر میلی لیتر

جدول ۱: میانگین تعداد سلول در حضور غلظت‌های  $0/9$ ،  $0/7$ ،  $0/5$ ،  $0/3$ ،  $0/1$  و  $0/0$  میلی‌گرم در لیتر کادمیوم و غلظت ۱ مولار نمک NaCl مربوط به ۴ تکرار  $\pm$  انحراف معیار در طی ۳۶ روز درسوسیه ایرانی *D. salina*

روز						$^{*}(\text{میانگین تعداد سلول بر میلی لیتر})$
$0/9$	$0/7$	$0/5$	$0/3$	$0/1$	.	
$0/25 \pm 0/1$	.					
$0/7 \pm 0/2$	$0/9 \pm 0/1$	$1/1 \pm 0/2$	$1/7 \pm 0/1$	$2 \pm 0/3$	$2/2 \pm 0/2$	۶
$2/2 \pm 0/2$	$2/5 \pm 0/1$	$3 \pm 0/1$	$3/9 \pm 0/1$	$4/3 \pm 0/1$	$6 \pm 0/1$	۱۲
$3/2 \pm 0/1$	$4/1 \pm 0/1$	$5 \pm 0/1$	$6 \pm 0/2$	$7/2 \pm 0/1$	$10/1 \pm 0/08$	۱۸
$2/2 \pm 0/3$	$2/8 \pm 0/2$	$3/8 \pm 0/1$	$4/5 \pm 0/2$	$6 \pm 0/04$	$7/5 \pm 0/15$	۲۴
$1/9 \pm 0/2$	$2/1 \pm 0/1$	$2/8 \pm 0/2$	$3/2 \pm 0/1$	$4/5 \pm 0/03$	$5/5 \pm 0/1$	۳۰
$1/1 \pm 0/1$	$1/8 \pm 0/3$	$2/2 \pm 0/3$	$2/9 \pm 0/3$	$3/2 \pm 0/1$	$4/4 \pm 0/4$	۳۶

جدول ۲: میانگین تعداد سلول در حضور غلظت‌های  $1/5$ ،  $2/0$  مولار نمک NaCl و تیمارشده با غلظت  $0/5$  میلی‌گرم در لیتر کادمیوم مربوط به ۴ تکرار  $\pm$  انحراف معیار در طی ۳۶ روز درسوسیه ایرانی *D. salina*.

روز			$^{*}(\text{میانگین تعداد سلول بر میلی لیتر})$
غلظت ۲ مولار نمک	غلظت $1/5$ مولار نمک	شاهد (مولار)	
$0/25 \pm 0/1$	$0/25 \pm 0/1$	$0/25 \pm 0/1$	.
$5/4 \pm 0/2$	$3/1 \pm 0/1$	$2/2 \pm 0/2$	۶
$11/3 \pm 0/6$	$8/5 \pm 0/2$	$6 \pm 0/1$	۱۲
$12/4 \pm 0/4$	$11 \pm 0/1$	$10/1 \pm 0/08$	۱۸
$10/3 \pm 0/2$	$9/5 \pm 0/2$	$7/5 \pm 0/15$	۲۴
$7/3 \pm 0/5$	$6/2 \pm 0/4$	$5/5 \pm 0/1$	۳۰
$6 \pm 0/2$	$5/5 \pm 0/4$	$4/4 \pm 0/4$	۳۶

جدول ۳: تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) با آزمون wilk's  $\lambda$  جهت بررسی اثر غلظت نمک NaCl و  $1/5$  و  $2$  مولار بر روی شاخص‌های اندازه‌گیری شده در حضور غلظت  $0/5$  میلی‌گرم در لیتر کادمیوم درسوسیه ایرانی *D. salina*

کلروفیل کل بر سلول		کلروفیل کل بر میلی لیتر		تعداد سلول		تیمارها
wilk's $\lambda$	F	wilk's $\lambda$	F	wilk's $\lambda$	F	
$0/00004^{**}$	$90/000$	$0/00001^{**}$	$512/654$	$0/00002^{**}$	$122/202$	اثر غلظت اصلی
$0/00005^{**}$	$7900/031$	$0/00001^{**}$	$36880$	$0/000052$	$2200/0501$	غلظت شاهد با $1/5$
$0/00014^{**}$	$5829/138$	$0/00004^{**}$	$54390$	$0/00026^{**}$	$3042/405$	غلظت شاهد با $2$
$0/01924^{**}$	$24/821$	$0/00014^{**}$	$36554$	$0/03000^{*}$	$49/722$	غلظت $1/5$ با $2$

نتایج باسطوح احتمال  $1\%$  ( $^{**}$ ) و  $5\%$  ( $*$ ) ارزیابی شده‌اند.

جدول ۴: میانگین کلروفیل کل در حضور غلظت‌های ۱، ۱/۵، ۲ و مولار نمک NaCl و تیمار شده با غلظت ۵/۰ میلی گرم در لیتر کادمیوم مربوط به ۴ تکرار ± انحراف معیار در طی روز در سویه ایرانی *D. salina*

میانگین کلروفیل کل						روز	
پیکوگرم بر سلول			میکروگرم بر میلی لیتر				
۲ مولار	۱/۵ مولار	شاهد (مولار)	۲ مولار	۱/۵ مولار	شاهد (مولار)		
۱/۹ ± ۰/۰۱	۱/۹ ± ۰/۰۲	۱/۹ ± ۰/۰۲	۰/۷ ± ۰/۰۳	۰/۷ ± ۰/۰۲	۰/۷ ± ۰/۰۲	۰	
۳/۵ ± ۰/۰۲	۳/۲ ± ۰/۰۴	۲/۹ ± ۰/۰۲	۵/۶ ± ۰/۰۲	۵/۲ ± ۰/۰۱	۴/۹ ± ۰/۱	۶	
۳/۹ ± ۰/۰۴	۳/۶ ± ۰/۰۳	۳/۲ ± ۰/۰۱	۷/۶ ± ۰/۰۴	۷/۱ ± ۰/۰۲	۶ ± ۰/۴	۱۲	
۲/۹ ± ۰/۰۲	۲/۴ ± ۰/۰۸	۲/۱ ± ۰/۰۳	۲۳/۲ ± ۰/۰۱	۲۲ ± ۰/۰۱	۲۰ ± ۰/۲	۱۸	
۲/۲ ± ۰/۰۱	۱/۹ ± ۰/۰۱	۱/۵ ± ۰/۰۱	۱۷/۴ ± ۰/۱	۱۶/۵ ± ۰/۰۴	۱۵/۱ ± ۰/۱	۲۴	
۱/۴ ± ۰/۰۲	۱/۳ ± ۰/۰۲	۱/۰۱ ± ۰/۰۲	۷/۹ ± ۰/۰۴	۷/۴ ± ۰/۰۸	۵/۲ ± ۰/۰۱	۳۰	
۱/۲ ± ۰/۰۱	۱ ± ۰/۰۱	۰/۴۶ ± ۰/۰۱	۲/۲ ± ۰/۰۲۱	۱/۴ ± ۰/۰۱	۰/۶ ± ۰/۰۴	۳۶	

and Koropatnick,J.). Taylor and Francis. London and new York , 34-74.

3- Chen , B.L. , Huang , Q., Shi , Q . and Wu, S. 1998; Accumulation of Ag , Cd,Co,Cu,Hg,Ni and Pb in *Pavlova viridis* Tseng (Haptophyceae). Journal of Applied phycology. 10,371-376 .

4- Eijckelhoff , C . and Dekker , J.P. 1997; A routine method to determine the chlorophyll a, pheophytin a and β - carotene contents of isolated photosystem II reaction center complexes. Photosynthesis Research .52,63-67.

5- Fabregas, J., Herrero ,C., Cabezas, B., Liano, R.and Abalde,J.1986; Response of the marine microalga *Dunaliella tertiolecta* to nuteirnt concentration and salinity variations in batch cultures . Journal of plant physiology . 125,475-484.

6- Fujii, S. 1991; The growth and intracellular ionic composition of *Dunaliella tertiolecta* in magnesium - rich media. Plant cell physiology . 32,549-554.

7- Jimenez, C. and Xavier Niell , F. 1991; Growth of *Dunaliella viridis* Teodoresco: Effect of salinity , temperature and nitrogen Concentration. Journal of Applied phycology. 3 , 319-327.

نمک، مقدار کلروفیل کل نیز بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر و پیکوگرم بر سلول نسبت به شاهد افزایش معنی داری (جدول آماری ۳) می‌یابد و این امر به این معناست که اثرات سمية کادمیوم در غلظت‌های بالاتر نمک کاهش یافته است و همانگونه که در مورد تقسیم سلولی در جدول ۱ اشاره شد به نظر می‌رسد این حالت نیز به علت افزایش کادمیوم به صورت  $CdCl_4$  در نتیجه کمتر جذب شدن آن توسط سلول‌ها باشد (۱۳).

به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق میین آن است که تنش حاصل از وجود کادمیوم در محیط موجب اختلال در شاخص‌های رشد از جمله تعداد سلول و میزان کلروفیل در جلبک *D. salina* می‌گردد که با افزایش شوری محیط این اثرات کاهش می‌یابد لذا مطالعات گستردۀ بروی تأثیرفلزات سنگین بر روی موجودات زنده و شناسایی عواملی که اثرات سمية این فلزات را کاهش می‌دهد از اهمیت خاصی برخوردار است.

#### منابع مورد استفاده

- 1-Ben-Amotz , A.and Avron. M. 1990; The biotechnology of cultivating the halo tolerant alga dunaliella. TIBTECH . 8,124-129
- 2- Bhattacharya , M. H. Wilson .A. K. , Brjan ,S.S. and Jonah, M.2000; Biochemical pathways in cadmium toxicity. In : Molecular biology and toxicology of metals (eds. Zalups , R. K.

- 8- Johnson, M.K., Johnson,E.J., McElrory, R.D. Speer, H.L. and Bruff, B.S. 1968; Effects of salt on the halophilic alga *Dunaliella viridis*. Journal of Bacteriology. 95,1461-1468.
- 9- Kastori , R. Plesincar. M, Sakac Z., Pankovic, D. and Arsenijevic – Maksimovic , I. 1998; Effect of excess lead on sunflower growth and photosynthesis. Journal of plant Nutrition. 21,75-85.
- 10- Khristoforova, N.K., Aizdaicher, N.A and Berezovskaya, O.U. 1996; The effect of copper ions and a detergent of green microalgae *Dunaliella tertiolecta* and *Platymonas* sp. Russian Journal of Marine Biology . 22 , 109-114 .
- 11- Lam , P.K.S, Wut , P.F. Chan , A.C.W . and Wu, R.S.S. 1999; Individual and combined effects of cadmium and copper on the growth response of *Chlorella vulgaris*. Environmental Toxicology . 14 , 347-353.
- 12- Nygard, C. and Ekelund, N.G.A. 1999; Effects of lead (PbCl<sub>2</sub>) on photosynthesis and respiration of the bladder Wrack , *Fucus vesiculosus* in relation to different salinities. Water, Air and Soil pollution. 116 , 549 –565.
- 13- Pick, U.1992; ATPase and ion transport in Dunaliella. In: *Dunaliella : Physiology, biochemistry and biotechnology.* (eds. Avron, M. and Ben – Amotz, A.) Boca Raton, Ann Arbor , London, Tokyo. CRC press, 63-98.
- 14- Pistocchi , R., Mormile, A.M., Guerrini , F., Isani, G. and Boni , L.2000; Increased production of extra – and intracellular metal – ligands in phytoplankton exposed to copper and cadmium . Journal of Applied Phycology. 12,469-477.
- 15- Romero – Puetas,M.C., Palam, J.M., Gomez,M., Del Rio,L.A.and Sandalio, L.M.2002; Cadmium causes the oxidative modification of proteins in pea plants Plant, Cell and Environment . 25 , 677 – 686.
- 16-Visviki,I. and Rachlin,J.W. 1994; Acute and chronic exposure of *Dunaliella salina* and chlamydomonas bullosa to copper and cadmium:Effects on growth.Archive Environmental contamination and Toxicology.26:154-162.
- 17- Woolhouse, H.W. 1983; Toxicity and tolerance in the responses of plants to metals. In: *Physiological plant ecology III*, (eds, Lange, O. L.Nobel,P.S. Osmond, C.B. and Ziegler. H.). Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg,New York, 245-300.

