

# بررسی چند شکلی پروتئین‌های آلكالین فسفاتاز، پیش ترانسفیرین، سل استراز، کاتالاز و هموگلوبین در دو جمعیت اسب عرب و اسبچه خزر ایران

- فضل الله افراز، موسسه تحقیقات علوم دامی
- سعید اسماعیل خایانی، موسسه تحقیقات علوم دامی
- حمیدرضا سیدآبادی، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ دریافت: خرداد ماه ۱۳۸۲      تاریخ پذیرش: مهر ماه ۱۳۸۳

## چکیده

این تحقیق به منظور تعیین چند شکلی پنج پروتئین پلاسما و گلبول قرمز خون شامل آلكالین فسفاتاز (Alp)، پیش ترانسفیرین (Ptf)، سل استراز (Cs)، کاتالاز (Cat) و هموگلوبین (Hb) در دو جمعیت اسب عرب و اسبچه خزر ایران انجام شد. فراوانی ژن‌ها، متواتر هتروزیگوستیته و تعداد آلل‌های موثر هر ژنگاه، بین دو جمعیت نیز مقایسه شدند. الکتروفوروز پلاسما و گلبول قرمز با استفاده از ژل نشاسته و آکریلامید انجام گرفت. از پنج ژنگاه موور آزمایش، فقط ژنگاه Cat چند شکلی نشان داد که شامل فنوتیپ‌های FF، FS و SS بود. اختلاف فراوانی دو آلل F و S در هر دو نژاد بسیار جزیی مشاهده گردید. ژنگاه‌های Hb به ترتیب در آلل‌های ۱، A، F، ۱ و A، F، ۱ تثیت شده بودند. متواتر هتروزیگوستیته و تعداد آلل‌های موثر در هر ژنگاه در اسبچه خزر و عرب به ترتیب ۰/۱۰۰۳، ۰/۰۹۷۳ و ۱/۱۸۷۴، ۰/۰۹۷۳ براورد گردیدند. از اطلاعات بدست آمده می‌توان چنین نتیجه گرفت که اسب‌های عرب مورد بررسی آمیخته‌ای از عرب‌های ایرانی با نژادهای نظیر ترورید، عرب و آنگلو عرب نمی‌باشند.

کلمات کلیدی: اسب عرب، اسبچه خزر، الکتروفوروز، پروتئین، تنوع ژنتیک

Pajouhesh & Sazandegi No 66 pp: 33-38

## Polymorphisms of alkaline phosphatase, pretransferrin, cell esterase ,catalase and hemoglobin proteins of Arab and Caspian minature, horses in Iran

By : F. Afraz, Animal Science Research Institute Karaj, Iran , S. Esmailkhani, Animal Science Research Institute Karaj, Iran and H.R. Seydabady, Islamic Azad University, Karaj, Iran

The present research has been carried out to identify polymorphism at five blood plasma and erythrocyte proteins in Arab and Caspian minature horse population. Gene frequencies were analyzed at five loci controlling blood proteins; alkaline phosphatase (Alp) , catalase (Cat) , cell esterase (Cs), hemoglobin (Hb) and pretransferrin (Ptf). In addition , heterozygosity and effective allele numbers within each population have also been determined. Plasma and erythrocyte

were electrophoresed for the mentioned proteins, using starch and polyacrylamid gels . Among of five examined loci, only Cat locus showed polymorphism that phenotypes were FF, FS and SS. Allele frequency difference F and S for two populations was too slight. Alp , CEs , Hb and Ptf were fixed at A, 1, 1 and F alleles , respectively. The average heterozygosity and effective allele numbers were calculated 0.1003, 1.1998 and 0.0973, 1.1874 in Caspian minature and Arab populations, respectively. From these data it was concluded that the examined Arab horses are not cross- bred of Iranian Arab and exotic race horse such as Arab, Anglo- Arab and Thoroughbred

**Key words:** Arab horse, Caspian minature, Electrophoresis, Protein, Genetic diversity.

## مواد و روش‌ها

### اسب

نژادهای اسب، محل نمونه برداری، روش نمونه برداری، تعداد نمونه‌ها و چگونگی جدا سازی پلاسماهای، قبل از ارایه گردید(۱).

### الکتروفورز

چهار پروتئین ، Alp ، CEs ، Hb و Cat پلاسما و گلبول‌های قرمز خون از طریق الکتروفورز ژل نشاسته آزمایش شدند . دراین تحقیق ژل نشاسته با غلظت ۱۲٪ مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور ۳۶ گرم نشاسته هیدرولیز شده را با ۳۰۰ میلی لیتر بافر ژل در داخل فلاسک ته گرد ریخته و برای حل شدن به مدت چند دقیق حرارت داده شد تا نشاسته کاملاً شفاف و چسبنده گردد . سپس توسط پمپ خلا دار به مدت ۴۰-۶۰ ثانیه هواگیری گردید . آنگاه در قالبی  $180 \times 130 \times 6$  میلیمتر ریخته شد و پس از دو ساعت که ژل در محیط آزاد قرار گرفت آماده انجام الکتروفورز گردید. برای الکتروفورز هموگلوبین، سل استار، کاتالاز از نمونه‌های گلبول خون و برای آکالین فسفاتاز از پلاسما استفاده شد که برای هموگلوبین نمونه‌ها ۱۰ بار و برای کاتالاز ۱۰۰ بار رقیق شدند. پیش ترانسفرین از طریق الکتروفورز ژل آکریلامید آزمایش شد. ژل مربوطه بر اساس الکتروفورز ترانسفرین آماده گردید (۱). اسامی پروتئین‌های مورد بررسی و منابع استفاده شده جهت الکتروفورز در جدول ۱ ارایه شده است . الکتروفورز با کمی اصلاح در روش‌های منابع جدول مذکور انجام پذیرفت.

### محاسبه فراوانی زن‌ها و برآورد تنوع ژنتیکی

محاسبه فراوانی زن‌ها از روش شمارش مستقیم فنوتیپ‌ها انجام پذیرفت . تنوع ژنتیک از طریق متوسط هتروزیگوستیه در هر فرد و تعداد آلل‌های موثر هر جایگاه برآورد گردید (۱۶، ۱۵) . متوسط هتروزیگوستیه با استفاده از فرمول  $\frac{1}{n} = \frac{1}{\sum H}$  بدست آمد . که آلل n در یک جایگاه n تعداد اسیان هر جمعیت و علامت بار متوسط کل جایگاه‌های آزمایش شده می‌باشد. تعداد آلل‌های موثر با استفاده فرمول  $\frac{1}{n} = \frac{1}{\sum N}$  محاسبه شد. که فراوانی آلل n در یک جایگاه و علامت بار متوسط کل جایگاه‌های آزمایش شده می‌باشد.

## نتایج

### چند شکلی پروتئین

معیار چند شکلی بودن هرزنگاه دراین پژوهش، این بود که وفور فراوان

### مقدمه

الکتروفورز پروتئین‌های خون اسب با استفاده از ژل نشاسته و پلی آکریلامید نشان داد که اغلب ژنگاه‌های مربوطه چند شکلی هستند (۱، ۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۳، ۲، ۲۰، ۲۱، ۱۸، ۱۶، ۱۴). آکالین فسفاتاز به صورت دو آلل A و B در نژادهای اروپایی، تایلندی و هوکایدو و تایشو ژاپنی مشاهده گردید، که فراوانی B در مقایسه با فراوانی A بسیار کم بود (۲، ۶، ۱۶، ۱۴، ۱۸). پیش ترانسفرین به صورت سه آلل F، D و S در اکثر نژادهای آسیایی گزارش شد، که بیشترین فراوانی مربوط به آلل F بود (۱۶). سه آلل ۱، ۲ و ۳ در سیستم سل استراز پنج نژاد اسب مغولی گزارش گردید (۱۶). تاکنون هموگلوبین به صورت چند شکلی گزارش نشده است (۲، ۴، ۱۱، ۱۴، ۲۱). چند شکلی کاتالاز تقریباً در ۴۰ نژاد مورد بررسی قرار گرفت، که آلل S فقط در دو نژاد تروبرد (Thoroughbred) و پونی هکنی (Hackney pony) تشییت شده بود ولی بقیه نژادها دو آلل F و S را با فراوانی مناسب نشان دادند (۳، ۴، ۵، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۲۰).

تنوع ژنتیکی با برآورد متوسط هتروزیگوستیه و یا تعداد آلل‌های موثر در هر لوکوس، در بسیاری از نژادهای بومی و اصلاح شده جهان گزارش گردیده است (۱، ۴، ۵، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۲۰).

با توجه به نژادها و جمعیت‌های مختلف با ارزش در کشور، مولفین قبلاً مبادرت به تحقیق ژنتیک در خصوص چند شکلی پروتئین‌های خون دو نژاد معروف یعنی عرب و اسبچه خزر نمودند که وسیله معتبر جهت انتخاب گله با هتروزیگوستیه بالا به عنوان ذخیره ژنتیکی و رد اعقاب می‌باشد (۱). به منظور تکمیل این اطلاعات و تعیین دقیق تر ساختار ژنتیک دو نژاد مذکور، چند شکلی پروتئین‌های آکالین فسفاتاز، پیش ترانسفرین، سل استراز، هموگلوبین و کاتالاز و نیز برآورد میزان تنوع ژنتیکی، از طریق الکتروفورز ژل پلی آکریلامید و نشاسته مورد تحقیق قرار گرفتند.

تنوع ژنتیک هر جمعیت با استفاده از فراوانی ژن های پنج ژنگاه کنترل کننده پروتئین های مورد بررسی برآورد و در جدول ۳ ارایه شده است. متوسط هتروزیگوستیته و تعداد آلل موثر در هر ژنگاه در نژاد عرب (به ترتیب ۰/۱۰۰۳ و ۰/۱۹۹۸) تقریباً مشابه با نژاد اسپیچه خزر (به ترتیب ۰/۰۹۷۳ و ۰/۱۸۷۴) بود.

### بحث

وجود بیش از ۲۰ نژاد، جمعیت و اکوتیپ اسب در کشور، مخصوصاً ویژگی های منحصر به فرد بعضی از جمیعت ها، منبع ژنتیکی بسیار غنی ای را پدید آورده است که لزوم تحقیقات ژنتیک را تایید می نماید، زیرا جهت معرفی به جهان، گزینش جمیعت ها برای حفظ ذخیره ژنتیک و اصلاح نژاد

ترین آلل کمتر از ۰/۹۹ باشد. در الکتروفورز از پنج ژنگاه ارایه شده در جدول ۱ فقط ژنگاه *Cat* به صورت چند شکلی مشاهده شد و تغییراتی را در داخل و بین دو نژاد نشان داد. نمونه های الکتروفورتیک فنوتیپ های پروتئین های مشاهده شده و فراوانی آلل های محاسبه شده دو نژاد به ترتیب در جدول ۲ و تصاویر ۱-۵ ارایه گردیده است. همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، در این پژوهش برای سیستم *Cat* سه فنوتیپ SS و Ff، FS ملاحظه گردید. گرایش فراوانی دو آلل *F* و *S* در دو جمیعت متفاوت بود. برای سیستم *Alp* فقط فنوتیپ AA که به وسیله آلل *A* کنترل می شود در دو نژاد مشاهده گردید (شکل ۲). در این پژوهش فنوتیپ ظاهر شده سیستم *Ptf* برای دو نژاد Ff بود (شکل ۳). و *CES* و *Hb* نیز فقط به صورت فنوتیپ ۱-۱ در دو نژاد مشاهده گردیدند (شکل های ۴ و ۵).

جدول ۱ - اسمای پروتئین های آزمایش شده


منبع	لوکوس	پروتئین
(۱۹۹۸) و همکاران Nozawa	Alp	آلکالین فسفاتاز
(۱۹۹۸) و همکاران Nozawa	Ptf	پیش ترانسفرین
(۱۹۷۰) و همکاران Shaw	CES	سل استراز
(۱۹۷۱) و همکاران Kelly	Cat	کاتالاز
(۱۹۷۵) و همکاران Nozawa	Hb	هموگلوبین

جدول ۲ - فراوانی آللی ۵ ژنگاه در دو نژاد اسب عرب و اسپیچه خزر

آلل	ژنگاه
A	آلکالین فسفاتاز
B	
D	پیش ترانسفرین
F	
S	
1	
2	
3	
1/۰۱	
۰/۴۹	
۰/۴۱	
۰/۵۹	
F	کاتالاز
S	
1	
0	
	هموگلوبین

جدول ۳ - متوسط هتروزیگوستیته و تعداد آلل موثر در دونژاد


تعداد آلل موثر	متوسط هتروزیگوستیته	نژاد
۰/۱۹۹۸	۰/۱۰۰۳	اسپ عرب
۰/۱۸۷۴	۰/۰۹۷۳	اسپیچه خزر



شکل ۱- نمونه‌های الکتروفورتیک کاتالاز در دو جمعیت اسب عرب و اسپجه خزر  
(عرب ۱-۳، اسپجه خزر ۴-۷)

شده نظیر عرب، انگلو عرب و تروبرد به صورت چند شکلی مشاهده گردید و فراوانی آلل *B* در مقایسه با آلل *A* بسیار اندک بود (۱۶). پژوهش حاضر نشان داد که آلل *A* در هر دو نژاد عرب و اسپجه خزر مثل سایر نژادها نظیر اسب‌های بومی مغولستان، چین، اندونزی و اسب‌های سنتگین اروپایی تشیبت شده می‌باشد (۱۶، ۶). آلل‌های گزارش شده پروتئین پیش ترانسفرین در نژادهای مختلف اسب *F* و *S* می‌باشد که در عرب و آنگلو عرب فقط آلل‌های *F* و *S* پدیدار شدن دو فراوانی آلل *S* نیز بسیار اندک بود (۱۶). تشیبت شدن آلل *F* در نژاد عرب در پژوهش حاضر مشابه وضعیت آن در اسب‌های اندونزی و اسب‌های سنتگین اروپا می‌باشد (۱۶). در تحقیقاتی که برای سیستم CEs در نژادهای مختلف اسب انجام پذیرفت، سه آلل ۱،


عملی در آینده مستلزم تحقق این امر است. از طرفی استقبال قابل توجه به سوار کاری و پرورش اسب در کشور سبب تلاقي‌های مختلف بعضی از جمعیت‌های معروف بومی با نژادهای اصلاح شده خارجی شده است که اطلاع از وضعیت ژنتیکی اعقاب را ضروری می‌سازد. در این رابطه شناسایی چند شکلی متغیرهای بیوشیمیایی ابزار مناسب جهت تحقق آن می‌باشد. تاکنون ۳۳ زنگاه کنترل کننده پروتئین‌های آنزیمی و غیر آنزیمی در حدود ۱۰۰ جمعیت و یا نژاد جهان مورد بررسی قرار گرفته است (۱، ۳، ۲، ۱، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲). تعداد قابل توجهی از این زنگاه‌ها چند شکل بوده و بعضی از آنها نیز چند شکلی بالایی را نشان دادند و تعدادی از پروتئینها مثل *Alp*, *Ptf*, *CEs* و



شکل ۳- نمونه‌های الکتروفورتیک پیش ترانسفرین  
در دو جمعیت اسب عرب و اسپجه خزر  
(عرب ۱-۵، اسپجه خزر ۶-۱۱)

۲ و ۳ مشاهده گردید، که فراوانی آلل *I* در اسب عرب بیشتر از بقیه آلل‌ها بود، ولی در تحقیقات مربوط به پونی‌ها فقط آلل ۱ مشاهده گردید (۱۶). اطلاعات بدست آمده از این پژوهش هماهنگ با نتایجی است که در سال ۱۹۹۸ توسط Nozawa و همکاران برای تعداد زیادی از نژادهای آسیایی گزارش شده است (۱۶).

آلل *I* سیستم CEs در تعداد زیادی از نژادهای آسیایی و اروپایی تشیبت شده است (۴، ۵، ۶، ۷، ۱۶). در این تحقیق نیز چنین وضعیتی برای دو




شکل ۲- نمونه‌های الکتروفورتیک آلkalین فسفاتاز در دو جمعیت اسب عرب و اسپجه خزر  
(عرب ۱-۴، اسپجه خزر ۵-۸)


*Hb* به مقدار اندکی در جمعیت‌ها به صورت چند شکلی گزارش شده اند که فراوانی بعضی از آلل‌های آنها گاهی به کمی بیشتر از ۱٪ می‌رسد (۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۲). آلkalین فسفاتاز با دو آلل *A* و *B* برای اولین بار در سال ۱۹۷۲ توسط Podliachouck و همکاران گزارش گردید (۱۹). سال‌ها بعد، در سال ۱۹۹۸ Nozawa و همکاران این آنزیم را در ۳۴ نژاد مورد بررسی قرار دادند که فقط در نژادهای تایلندی، هوکایدو و تایشو-زاپنی، پونی اروپایی ولش و در نژادهای اصلاح

## سل استراز

### فلوتبیب



شکل ۴ - نمونه‌های الکتروفورتیک سل استراز در  
دو جمعیت اسب عرب و اسبجه خزر  
(عرب ۳-۱، اسبجه خزر ۶-۴)



شکل ۵ - نمونه‌های الکتروفورتیک هموگلوبین در  
دو جمعیت اسب عرب و اسبجه خزر  
(عرب ۴-۱، اسبجه خزر ۸-۵)

در داری و دکتر امینی به خاطر همکاری صمیمانه در تهیه نمونه‌های خون سپاسگزاری می‌گردد. ونیز از آقای مهندس یوسف نیا که با در اختیار گذاشتن شجره نامه اسب‌های عرب و تهیه نمونه‌ها ما را در انجام این پژوهش باری نموده‌اند صمیمانه قدردانی می‌شود. از آقای مهندس صدیقی که در امور کامپیوتر و امور گرافیک همکاری صمیمانه داشته اند از صمیم قلب سپاسگزاری می‌گردد.

### منابع مورد استفاده

- ۱- افراز، ف.، س. اسماعیل خانیان، ا. رستگاری و ف. امینی، ۱۳۸۱. بررسی نشانگرهای ژنتیکی

نزاد مورد بررسی یعنی عرب و اسبجه خزر مشاهده گردید. در پژوهش حاضر برای سیستم Hb همانند پژوهش‌های محققان دیگر فقط آلل I مشاهده شد (۲۰، ۲۱، ۱۴، ۵، ۲). اولین گزارش مربوط به چند شکلی Cat در سال ۱۹۷۱ توسط Kelly و همکاران ارایه گردید (۱۳). آنها با الکتروفورز گلبول‌های قرمز در ژل نشاسته (pH=۸) دو آلل همبارز را در اسب‌های کوارتر (Quarter)، تروبرد (Thoroughbred) و شتلند (Shetland) پیدا نمودند. در سال ۱۹۷۲ Schleger و همکاران نیز این دو آلل را در اسب‌های اطربیشی پیدا نمودند (۲۰). ذر سال ۱۹۹۰ Bowling و همکاران تنوع Cat را در ۲۷ آنها نیز دو آلل مشاهده نمودند که آلل S فراوان ترین آلل در همه جمعیت‌ها بود. از طرفی این دو آلل یعنی F و S در ۲۶ نژاد آسیایی (شرق، جنوب شرقی و جنوب) دارای فراوانی متعادل بودند، هرچند که گرایش فراوانی دو آلل مذکور در همه جمعیت‌ها یکسان مشاهده نگردید (۱۶). فراوانی دو آلل F و S در دو جمعیت عرب و خزر نیز متفاوت بود ولی کلاً از نظر میزان فراوانی با اکثر نژادهای آسیایی مشابه است. نکته قابل توجه‌اینکه فراوانی آلل S در بومی‌های اروپایی گرایش افزایشی نشان داد بطوري که در بونی هکنی تثبیت شده بود یعنی وضعیت متفاوتی را با خزر داشت. در حالیکه آلل‌های F و S در اسب‌های باری (Draft horse) پرچون (Perchron) و برتن (Breton) فراوانی مشابه با فراوانی این آلل‌ها در خزر داشتند (۱۶، ۳). بنابراین تحقیق نیاز به بررسی دقیق تر از طریق تجزیه DNA دارد. فراوانی آلل S در اسب‌های مسابقه یعنی عرب، آنگلو عرب بسیار اندک گزارش گردید که میل به تثبیت شدن دارد و در تروبرد تثبیت شده است (۲۰، ۳، ۱۶).

که از این نظر کاملاً متفاوت با عرب ایرانی می‌باشد. برآورد متوسط هتروزیگوستیه (H) معیار مناسبی برای معرفی تنوع ژنتیک در داخل جمعیت یا نژاد می‌باشد (۱۵). متوسط هتروزیگوستیه و تعداد آلل‌های موثر هر لوکوس در دو جمعیت مورد بررسی نسبتاً پایین بود که دلیل عدمه آن تثبیت شدن چهار لوکوس، Alp و Ptf، CEs و Hb در یکی از آلل‌های مربوط به خودشان می‌باشد، ولی میزان برآورد شده مشابه هتروزیگوستیه بسیاری از نژادهای بومی آسیایی می‌باشد (۱۶)، هرچند که در صورت افزودن اطلاعات سایر لوکوس‌ها، متوسط هتروزیگوستیه افزایش خواهد یافت (۱).

نتایج این پژوهش نشان داد که I- کاتالاز در هر دو

جمعیت از فراوانی مطلوبی برخوردار می‌باشد، لذا می‌تواند در تعیین آزمون آنساب مورد استفاده قرار گیرد. II- اسب‌های عرب‌ایرانی بررسی شده فاقد خون‌های اسب‌های مسابقه نظیر تروبرد، عرب و آنگلو عرب می‌باشند.

### سپاسگزاری

از سرکار خانم فیروز و آقایان دکتر میریان، دکتر

- three Lithuanian native horse breeds. *Acta Agri. Scan.*, 53:180-186.
- 13-Kelly, E.p., C. Stormont, and Y. Suzuki, 1971; Catalase polymorphism in the red cells of horses. *Anim. Blood Grps and Biochem. Genet.* , 2:135-143.
- 14-Lubas. G., and G. Groce, 1980; Study of enzymes and Iso. enzymes in the horse according to breeds aptitude and productive ability . *Annali Della facolta Di Medicina Veterinaria Dispisa.* 33:159-173
- 15-Nei, M., 1978; Estimation of average heterozygosity and genetic distance from a small number of individuals. *Genet.*, 89: 583-590.
- 16-Nozawa, K., T. Shotake, S. Ito and Y. Kawamodo, 1998. Phylogenetic relationship among Japanese native and alien horses estimated by protein polymorphisms. *J. Equine Sci.*, 9: 53-69
- 17- Nozawa, K., T. Shotake, and Y. Ohkura, 1975. Blood protein variations within and between the East Asian and European horse populations. *Trerzuchty ziichtysivl.q3*: 60-74.
- 18-Ouragh, L., Je. Meriau, JP. Braun, 1994; Genetic blood markers in Arabian , Barb and Arab- Barb horse in Morocco. *Anim. Genet.*, 25:45-47.
- 19-Podliachouck, L., H. Balbierz, M. Kaminski, M. Nikalajczuk, and A. Strzelecka, 1972. Immunogenetic study of the Mur- Island horses. Proc. 12th European Conf. Anim. Blood Grps and Biochem. Polymorphysm. Budapest, PP. 533-536.
- 20-Schleger, W., P. Kramser and E. Dworak, 1972; Catalase and ceruloplasmin polymorphism in three Austrian horse breeds. *Anim. Blood Grps and Biochem. Genet.* , 3(Suppl.1):48.
- 21-Shaw, C.R., and R. Prasad, 1970; Starch gel electrophoresis of enzymes a compilatin of recipes. *Biochem. Genet.* , 4:297-320.
- 22-Uzun, M.,A.Karkhane, A.Kopar, 2001; Study of eight blood protein polymorphic system in Arabic horses from Turkey Rus.J.Genet. 37:1403 – 1408.

خون در جمعیت‌های مختلف اسپان ایران : چند شکلی پروتئین‌های آلبومین، فرآلبومین، استراز، ترانسفرین دردوجمعیت اسب عرب و اسبچه خزر ایران . مجله پ و س، شماره ۵۴: ۴۰ - ۴۴

- 2-Bowling, A.T. and R.S. Clark, 1985; Blood group and protein polymorphism gene frequencies for seven breeds of horse in The United States. *Anim. Blood Grps.and Biochem.Genet.*,16:93-108.
- 3-Bowling , A.T., L. Gordon, M.C.T. Penedo, E. Wietum and J. Beebout .1990; A single gel for determing genetic variations of equine erythrocyte carbonic anhydrase (CA) and catalase (Cat). *Anim. Genet.*, 21:191-197.
- 4-Cholewinski, G., B. Gralak, E.G. Cothran, and E. Iwanczyk, .2002; Genetic diversity of two rare horse breeds from Poland. Proc. 28 th ISAG Conf. Germany, P.90
- 5-Cothran, E. G., 2002; Genetic diversity in feral horse and burro populations. Proc. 28 th ISAG Conf. Germany, P.92.
- 6-Cothran, E.G. and M. Kovac, 1997; Genetic.analysis of the Croatian.Trakehner and Posavina horse breeds. *Zivocisna Vyroba*, 42:207-212. 7-Cothran, E.G., S.A. Santos, M.C.M. Mazza, T.L. Lear, J.R.B.Sereno,1998; Genetics of the Pantanero horse of the Pantanal region of Brazil. *Genetic and Mol., Bio.*, 21:343 – 349.
- 8-Cothran E. G., E. van Dyk. 1998; Genetic analysis of three South African horse breeds. *J. S. Afr. Vet. Association*, 69:120-125.
- 9-Cunningham, P., 1991; The genetics of Thoroughbred horses. *Sci . Am .*, 246:92 98
- 10-Diaz, S., F.N. Dulout and P. Peral- Garcia, 2002; Greater genetic variability in Argentine Creole than in Thoroughbrd horses based on serum protein polymorphisms. *Genet. Mol. Res.* 1(3):261-265.
- 11-Ertugrul , O., B. Akyuz., and A. Kopar, 2002; Blood protein polymorphism in some native horse types in Turkey. Proc. 28 th ISAG Conf. Germany, P.94.
- 12-Juras, R., E.G. Cothran, R. Klimas, 2003; Genetic analysis of

