



بررسی برخی صفات زیستی لاکپشت‌های دریایی در جزیره هرمز و هنگام

• بهزاد سعیدپور، دانش آموخته مقطع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • احمد سواری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • محمدرضا احمدی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تاریخ دریافت: تیر ماه ۱۳۸۲ | تاریخ پذیرش: دی ماه ۱۳۸۲

چکیده

به منظور بررسی برخی خصوصیات زیستی لاکپشت‌های دریایی دو جزیره هنگام و هرمز برای مطالعه انتخاب گردیدند، در طی سال ۱۳۷۸ تعداد ۷۳ عدد لاکپشت مورد زیست سنجی قرار گرفته و صفات موردنظر از جمله وزن، طول و عرض مستقیم لاکپشتی، طول و عرض منحنی لاکپشتی، طول لاکزیرین، طول دم و تعداد تخم‌های گذاشته شده اندازه گیری گردید، سپس اطلاعات جمع آوری شده در نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج حاصل نشان داد که فقط لاکپشت‌های عقابی (*Eretmochelys imbricata*) برای تخم‌گذاری به این جزیره می‌آمدند و از ۷۳ عدد لاکپشت زیست سنجی شده فقط ۴۵ عدد تخم‌گذاری نمودند که درصد لاکپشت‌های تخم‌گذاری نموده در جزیره هنگام به مراتب بیشتر از هرمز بود. همچنین در مقایسه بین وزن لاکپشت‌ها، نتایج نشان دادند که حداقل وزن لاکپشت‌ها ۳۵ کیلو و حداقل آنها ۵۷ کیلو بوده است که از توزیع بالایی برخوردار می‌باشد. مقایسه بعدی بر روی تعداد تخم لاکپشت‌ها صورت پذیرفت، کمترین تعداد تخم گذاشته شده به ازای یک لاکپشت ۷۲ عدد و بیشترین آن ۱۲۶ عدد و متوسط آنها ۹۰ عدد به ازای هر لاکپشت بود در صورتیکه حداقل و حداقل استاندارد جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ عدد می‌باشد. این در صورتی است که متوسط تخم‌های گذاشته شده در غرب خلیج فارس ۷۹ عدد می‌باشد که این رقم به مراتب از دو جزیره فوق کمتر است. در نهایت چنین نتیجه گیری گردید که لاکپشت‌های عقابی که در خلیج فارس تخم‌گذاری می‌کنند از متوسط وزن و طول کمتری نسبت به متوسط جهانی برخوردارند و همچنین تعداد تخم کمتری نیز می‌گذارند ولی لاکپشت‌های شرق خلیج فارس از غرب خلیج فارس بزرگ‌ترند و تخم‌های بیشتری نیز می‌گذارند.

کلمات کلیدی: گونه، لاکپشت دریایی زیست سنجی - صفات زیستی

Pajouhsh & Sazandegi No 61 pp: 76-81

The investigation of sea of biological aspects of sea turtles in Hormoz and Henqam islands

By: B. Saeedpour. Student at Ph.D of Azad University. Science and Research Unit, Savari A. Azad University , Science and Research Unit, Ahmadi M.R. Azad University, Science and Research Unit

In the present study an attempt was made to investigate some of the biological aspects of sea turtles in Hormoz and Henqam islands. In this regard 73 turtles were chosen for the biometry and their biological specifications, including weight , straight length and width , curved length and width, plastron length, tail length and their egg laying were recorded. The obtained results were analyzed in the statistical package of social science (SPSS). The results revealed that only Hawksbill turtle (*Eretmochelys imbricata*) attend these islands for egg laying. Only 45 turtles out of 73 laid eggs. The percentage of egg laying in Henqam in comparison with Hormoz was more. In regard with the weight the minimum was 35 kg and the maximum was 57 kg which showed a high distribution, although the width of them in comparison with the ones in the world was low, relative to the ones in the west of Persian Gulf was high. In comparison between the laid eggs, the result showed that the minimum of laid eggs per one turtle was 75 and the maximum was 126, meanwhile the world standard is between 100 to 160 and in the west of Persian Gulf was 79. It can be concluded that Hawksbill turtles in Persian Gulf are lighter and shorter and lay fewer eggs than the average of the world. It should be mentioned that in the east of Persian Gulf the turtles are bigger , and more laid eggs in comparison with the turtles of the west.

Keywords: Species, Sea turtle, Biometry, Biological aspects.

مقدمه

تاریخ زندگی لاکپشت‌های دریایی به زمان دایناسورها برمی‌گردد و از دوره ژوراسیک تاکنون این موجودات توانسته اند طی میلیونها سال در عین سازگاری با محیط به حیات خود ادامه دهند (۱۱). از قرن ۱۸ به بعد به علت افزایش جمعیت انسانی و تصرف در زیستگاه آنان و عوامل دیگر، جمعیت آنها رو به انفراض گذاشت بطوریکه طی قرن بیستم بیشترین لطمات را طی میلیونها سال حیات خود متتحمل شدند و در حال حاضر جزو گونه‌های حفاظت شده سازمان جهانی IUCN^۱ قرار گرفته اند (۱۲).

از میان ۸ گونه لاکپشت‌های دریایی ۵ گونه از آنها در خلیج فارس و دریای عمان به شرح زیر گزارش شده اند (۱۰، ۱) :

پس از جنگ خلیج فارس تنوع زیستی در منطقه شدیداً تحت تاثیر آلودگی‌های نفتی قرار گرفت (۸) لذا مطالعه بر روی لاکپشت‌های دریایی که به‌نظر می‌رسد از تحمل کمتری در مقابل آلودگیها برخوردارند ضرورت پیدا کرد (۷). همچنین با توجه به اینکه در سواحل جنوبی ایران تا به حال مطالعه جدی روی لاکپشت‌ها صورت نگرفته است و آمار دقیقی

از جمعیت این موجودات آبزی در دست نیست و نیز طی سالهای اخیر خلیج فارس دستخوش مشکلات فراوانی از جمله آلودگی‌های نفتی، صید بی‌رویه، دستکاری در سواحل و غیره بوده است (۴) این سوال مطرح می‌شود که آیا هنوز این آبزیان از جمعیت مناسبی برخوردارند یا خیر؟

| نام فارسی | نام انگلیسی | نام لاتین |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| لاکپشت سبز | Green turtle | <i>Chelonia mydas</i> |
| لاکپشت عقابی | Hawksbill turtle | <i>Eretmochelys imbricata</i> |
| لاکپشت زیتونی | Olive ridley turtle | <i>Lepidochelys olivacea</i> |
| لاکپشت سرخ | Loggerhead turtle | <i>Caretta caretta</i> |
| لاکپشت پشت چرمی | Leatherback turtle | <i>Dermochelys coriacea</i> |

لاکپشت‌هایی که برای تخمگذاری آمدند با تعدادی که تخمگذاری کردند متفاوت بودند در مجموع می‌توان گفت از تعداد ۷۳ لاکپشت زیست سنじ شده فقط ۴۵ لاکپشت تخمگذاری کردند. (جدول ۱) با توجه به تعدد صفات، دو صفت وزن و طول مورد توجه بیشتر قرار گرفت لذا مقایسه بین آنها به شرح زیر صورت پذیرفت.



تصویر شماره ۱: لاکپشتی در حال زیست‌سننجی

مواد و روشها


پس از بررسی‌های میدانی و مطالعه روی فعالیت‌های انجام شده در سال ۱۳۷۸، دو جزیره هنگام و هرمز که هر دو تقریباً در دهانه ورودی خلیج فارس قرار دارند، مورد مطالعه قرار گرفتند (شکل شماره ۱). پس از انتخاب جزایر طی ماههای اسفند تا خردادماه لاکپشت‌ها مورد زیست‌سننجی قرار گرفتند و صفات زیر از جمله : وزن، طول منحنی پشتی، عرض منحنی پشتی، طول مستقیم لاکپشت، عرض مستقیم لاکپشت، طول لاک‌زیرین و طول دم ، تعداد کل تخم گذارده شده و تعداد تخم نرمال و غیرنرمال هر لاکپشت مورد زیست سننجی قرار گرفت (۲) . سپس اطلاعات جمع آوری شده در نرم افزار آماری SPSS دسته بندی و ثبت گردید بعد از دسته بندی آزمون همبستگی، رگرسیون و جدول آنوا برای آنها محاسبه گردید. در مرحله تجزیه و تحلیل مقایسه بین نتایج آماری صورت پذیرفت و نتایج بعضی از صفات در دو جزیره با هم مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج

نتایج حاصل از زیست‌سننجی لاکپشت‌ها نشان می‌دهد که تعداد

جدول ۱- تعداد لاکپشت‌های زیست‌سننجی شده و تخمگذاری کرده در جزایر هرمز و هنگام (۱۳۷۸)

| درصد تخمگذاری کرده نسبت به زیست سننجی شده | تعداد لاکپشت تخمگذاری کرده | تعداد لاکپشت زیست‌سننجی شده | جزیره |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------|
| ۷۸ | ۲۱ | ۲۷ | هنگام |
| ۵۲ | ۲۴ | ۴۶ | هرمز |
| ۶۲ | ۴۵ | ۷۳ | جمع |



شکل ۱ - موقعیت جزایر مورد مطالعه در خلیج فارس

در جزیره هرمز ۸۶ و جزیره هنگام ۹۷ عدد بود.

بحث و نتیجه‌گیری

زیست سنجی لاکپشت‌ها در جزایر هنگام و هرمز نشان داد که تنها گونه‌ای که برای تخمگذاری به این جزایر می‌آید گونه لاکپشت عقابی است. تمامی لاکپشت‌ها تخمگذاری نمی‌کنند و تعدادی به‌دلیل مختلف از جمله مناسب نبودن ساحل، وجود آلودگی و دلایل دیگر از تخمگذاری منصرف می‌شوند (۵، ۶، ۹). در تحقیق انجام شده حدوداً ۶۲٪ از لاکپشت‌ها تخمگذاری کردند. مقایسه بین وزن لاکپشت‌ها نشان داد که گرچه لاکپشت‌ها در جزیره هنگام از توزیع وزنی بیشتری برخوردارند اما متوسط وزن لاکپشت‌های هرمز بیشتر می‌باشد (شکل ۴).

بررسی نتایج حاصل از تخمگذاری لاکپشت‌ها نشان داد که گرچه متوسط تعداد تخم لاکپشت‌ها در جزیره هنگام بیشتر از تخم‌های گذاشته شده در جزیره هرمز بود ولی این افزایش از نظر آماری هیچ تفاوت معنی داری نشان نداد. البته تعداد تخم‌های نرمال و غیرنرمال نیز در جزیره هنگام بیشتر از هرمز بود همچنین درصد بیشتری از لاکپشت‌ها در جزیره هنگام نسبت به جزیره هرمز تخمگذاری کردند. همچنین بررسیها نشان داد که متوسط وزن لاکپشت‌ها در دو جزیره مزبور ۴۵ کیلوگرم بوده در حالیکه متوسط این لاکپشت‌ها در مطالعات انجام شده در غرب خلیج فارس ۳۸ کیلوگرم بوده است (۳) و متوسط جهانی وزن لاکپشت‌های گونه عقابی بین ۴۵ تا ۷۵ کیلوگرم قید شده است (۱۱). این موضوع بیانگر آنست که وزن لاکپشت‌های عقابی در خلیج فارس کمتر از متوسط جهانی است. در

نتایج حاصل نشان داد که صفات زیست سنجی شده از دامنه نسبتاً وسیعی برخوردار می‌باشد به عنوان مثال در مقایسه بین وزن لاکپشت‌ها، حداقل وزن آنها ۳۵ کیلو و حداقل آنها ۵۷ کیلوگرم بود.

نتایج زیست سنجی لاکپشت‌ها در جزیره هرمز

در جزیره هرمز حداقل وزن لاکپشت‌ها ۳۵ کیلو و حداقل آنها ۵۲ کیلوگرم بود که نشان دهنده این موضوع است که لاکپشت‌ها از نظر سنی تفاوت نسبتاً بالایی با هم دارند شکل ۲ نشان می‌دهد که وزن لاکپشت‌های جزیره هرمز عموماً بین ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم می‌باشد.

(جدول ۳) نشان می‌دهد که طول مستقیم لاکپشت‌ها در جزیره هرمز از تفاوت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. وجود حداقل طول ۸۴ و حداقل ۶۶ و میانگین ۷۵ سانتیمتر علاوه بر بیان پراکنش طولی خوب نشان دهنده سن نسبتاً بالای آنها نیز می‌باشد.

نتایج زیست سنجی لاکپشت‌ها

در جزیره هنگام

در جزیره هنگام حداقل وزن لاکپشت‌های زیست سنجی شده ۳۸ کیلوگرم و حداقل آنها ۵۷ کیلوگرم و متوسط آن ۴۴/۵ کیلوگرم بود و بیشترین تعداد لاکپشت در وزن ۴۰ کیلوگرم قرار داشتند. (شکل ۳) بررسی آنالیز آماری صفات زیست سنجی شده در جزیره هنگام نشان می‌دهد که حداقل طول آنها ۶۰ سانتیمتر و حداقل آنها ۷۲ سانتیمتر و متوسط ۶۵ سانتیمتر بود که از یک توزیع نسبتاً نرمال نسبت به جزیره هرمز برخوردار می‌باشد. در مورد سایر صفات نیز تقریباً همین نتایج صادق است (جدول ۴).

نتایج حاصل از تخمگذاری لاکپشت‌ها در دو جزیره

همانطور که در ابتدا گفته شد در دو جزیره هنگام و هرمز جمعاً ۴۵ عدد لاکپشت تخمگذاری کردند که برابر با ۶۲٪ کل لاکپشت‌های بود که بالا آمدند (جدول ۱) تعداد تخم‌های گذاشته شده توسط لاکپشت‌ها متفاوت می‌بود به طوریکه تعداد تخم‌های گذاشته شده بین ۷۲ تا ۱۲۶ عدد متغیر بود که هر دو مربوط به جزیره هرمز است در جزیره هنگام حداقل تعداد تخم گذاشته شده ۷۵ عدد و حداقل ۱۲۱ عدد بود (جدول ۵).

در توزیع تخم‌های گذاشته شده مشاهده شد که ۱۴٪ از لاکپشت‌ها ۸۲ عدد تخم گذاشته اند و متوسط کل تخم‌های گذاشته شده به ازای هر لاکپشت ۹۰ عدد بود این در صورتی است که متوسط تخم لاکپشت‌ها

جدول ۲ : مقایسه وزن لاکپشت‌های زیست سنجی شده در دو جزیره هنگام و هرمز (۱۳۷۸)




| جزیره | تعداد | متوجه وزن | حدوده تغییرات وزن | حداقل وزن | حدوده تغییرات وزن |
|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| هرمز | ۴۶ | ۴۹/۴۲ | ۳۵ | ۳۵ | ۱۷ |
| هنگام | ۲۷ | ۴۲/۴۶ | ۵۷ | ۳۸ | ۱۹ |

جدول ۳ - آنالیز آماری صفات لاکپشت‌های زیست سنجی شده در جزیره هرمز (۱۳۷۸)

| محدوده | حداقل | حداکثر | میانگین | | انحراف استاندارد | واریانس | انحراف منحنی | | قوس منحنی | | تعداد | صفات |
|--------|-------|--------|---------|----------------|------------------|---------|--------------|----------------|-----------|----------------|-------|-------------------|
| | | | آماری | خطای استاندارد | | | آماری | خطای استاندارد | آماری | خطای استاندارد | | |
| ۱۷/۰۰ | ۳۵/۰۰ | ۵۲/۰۰ | ۴۶/۴۲۳۹ | ۰/۵۹۴۷ | ۴/۰۳۳۲ | ۱۶/۲۶۶ | -۱/۱۱۴ | ۳۵۰/ | ۱/۱۰۸ | ۰/۶۸۸ | ۴۶ | وزن (kg) |
| ۱۸/۰۰ | ۶۶/۰۰ | ۸۴/۰۰ | ۷۵/۹۵۶۵ | ۰/۵۴۲۶ | ۳/۶۷۹۹ | ۱۳/۵۴۱ | -۱/۱۱۹ | ۳۵۰/ | ۱/۳۴۹ | ۰/۶۸۸ | ۴۶ | طول منحنی (cm) |
| ۲۲/۰۰ | ۵۱/۰۰ | ۷۳/۰۰ | ۶۶/۲۸۲۶ | ۰/۵۷۱۸ | ۳/۸۷۷۹ | ۱۵/۰۳۸ | -۱/۳۷۴ | ۳۵۰/ | ۱/۱۵۱ | ۰/۶۸۸ | ۴۶ | عرض منحنی (cm) |
| ۱۶/۰۰ | ۵۷/۰۰ | ۷۳/۰۰ | ۶۸/۶۸۹۱ | ۰/۸۲۱۳ | ۴/۲۸۱۵ | ۱۸/۳۳۱ | -۰/۲۵۶ | ۳۵۰/ | -۰/۱۷۲ | ۰/۶۸۸ | ۴۶ | طول مستقیم (cm) |
| ۱۶/۰۰ | ۴۵/۰۰ | ۶۱/۰۰ | ۵۶/۲۶۹۶ | ۰/۸۸۳۱ | ۵/۹۸۹۵ | ۳۵/۸۷۴ | -۱/۰۳۳ | ۳۵۰/ | ۲۳۴/ | ۰/۶۸۸ | ۴۶ | عرض مستقیم (cm) |
| ۱۵/۰۰ | ۴۴/۰۰ | ۵۹/۰۰ | ۵۴/۸۴۷۸ | ۰/۶۲۶۷ | ۴/۲۵۰۳ | ۱۸/۰۶۵ | -۱/۱۵۱۰ | ۳۵۰/ | ۱/۰۶۳ | ۰/۶۸۸ | ۴۶ | طول پلاسترون (cm) |
| ۹/۰۰ | ۱۱/۰۰ | ۲۰/۰۰ | ۱۷/۵۲۱۷ | ۰/۴۰۱۱ | ۲/۷۲۰۲ | ۷/۴۰۰ | -۱/۷۸۹ | ۳۵۰/ | ۱/۹۶۶ | ۶۸۸/ | ۴۶ | طول دم (cm) |

جدول ۴ - آنالیز آماری صفات لاکپشت‌های زیست سنجی شده در هنگام (۱۳۷۸)

| محدوده | حداقل | حداکثر | میانگین | | انحراف استاندارد | واریانس | انحراف منحنی | | قوس منحنی | | تعداد | |
|--------|-------|--------|---------|----------------|------------------|---------|--------------|----------------|-----------|----------------|-------|-------------------|
| | | | آماری | خطای استاندارد | | | آماری | خطای استاندارد | آماری | خطای استاندارد | | |
| ۱۹/۰۰ | ۳۸/۰۰ | ۵۷/۰۰ | ۴۳/۴۶۳۰ | ۰/۹۷۸۰ | ۵/۰۸۱۹ | ۲۵/۸۲۵ | ۱/۰۷۸ | ۰/۴۸۸ | ۰/۶۵۵ | ۰/۸۷۲ | ۲۷ | وزن (kg) |
| ۱۵/۰۰ | ۶۵/۰۰ | ۸۰/۰۰ | ۷۱/۳۵۱۹ | ۰/۷۳۵۲ | ۳/۸۲۰۰ | ۱۴/۵۹۳ | ۰/۳۵۵ | ۰/۴۴۸ | -۰/۴۱۳ | ۰/۸۷۲ | ۲۷ | طول منحنی (cm) |
| ۲۶/۰۰ | ۴۶/۰۰ | ۷۲/۰۰ | ۶۵/۲۴۰۷ | ۰/۹۶۳۹ | ۵/۰۰۸۴ | ۲۵/۰۸۴ | -۲/۲۱۹ | ۰/۴۴۸ | ۷/۶۸۵ | ۰/۸۷۲ | ۲۷ | عرض منحنی (cm) |
| ۱۲/۰۰ | ۶۰/۰۰ | ۷۲/۰۰ | ۶۵/۳۱۴۸ | ۰/۵۶۹۴ | ۲/۹۵۸۵ | ۸/۷۵۳ | ۰/۴۴۴ | ۰/۴۴۸ | ۰/۵۶۸ | ۰/۸۷۲ | ۲۷ | طول مستقیم (cm) |
| ۱۵/۰۰ | ۴۶/۰۰ | ۶۱/۰۰ | ۵۲/۳۸۸۹ | ۰/۶۱۶۹ | ۳/۲۰۰۵۶ | ۱۰/۲۷۶ | ۰/۴۵۷ | ۰/۴۴۸ | ۱/۲۳۱ | ۰/۸۷۲ | ۲۷ | عرض مستقیم (cm) |
| ۱۱/۰۰ | ۴۷/۰۰ | ۵۸/۰۰ | ۵۲/۲۷۷۸ | ۰/۵۷۶۳ | ۲/۹۹۴۷ | ۸/۹۶۸ | -۰/۰۷۷ | ۰/۴۴۸ | -۰/۹۶۴ | ۰/۸۷۲ | ۲۷ | طول پلاسترون (cm) |
| ۹/۰۰ | ۱۰/۰۰ | ۱۹/۰۰ | ۱۴/۷۷۷۸ | ۰/۵۶۷۰ | ۲/۹۴۶۱ | ۸/۶۷۹ | -۰/۳۰۶ | ۰/۴۴۸ | -۱/۷۷ | ۰/۸۷۲ | ۲۷ | طول (cm)۲ |



مورد طول لاکپشت‌ها نیز رابطه فوق صادق می‌باشد. متوسط تعداد جهانی تخم گذاشته شده بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ عدد می‌باشد در صورتیکه تعداد تخم گذاشته شده در دو جزیره مذکور بین ۷۵ تا ۱۲۶ عدد می‌باشد که نشان‌دهنده این موضوع است که لاکپشت‌های خلیج فارس تعداد تخم کمتری نیز نسبت به متوسط نقاط دیگر جهان دارند، مقایسه بین این دو جزیره با غرب خلیج فارس با متوسط تخم گذاشته شده ۷۹ عدد نشان می‌دهد که لاکپشت‌ها در این قسمت تعداد تخم بیشتری نسبت به غرب خلیج فارس می‌گذارند.

پاورقی

1- International Union Conservation of Nature and Natural Resources

منابع مورد استفاده

- ۱- حاج رسولی ها ، م. ، لاکپشت‌های دریایی ، نشریه آبزیان شماره ۱۷
- ۲- سعیدپور، ب. ۱۳۷۸. راهنمای شناسایی و بیومتری لاکپشت‌های دریایی، سازمان حفاظت محیط زیست
- ۳- ولوی، ح. ۱۳۷۳. تخمگذاری لاکپشت‌های عقابی در جزایر منطقه حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست

جدول ۵ - تعداد تخم‌های گذاشته شده در دو جزیره هرمز و هنگام (۱۳۷۸)

| تعداد | جمع کل | حداکثر | حداقل |
|--------------------|--------|--------|-------|
| تعداد کل تخمها | ۱۲۱ | هنگام | ۷۵ |
| | ۱۲۶ | هرمز | ۷۲ |
| | ۱۲۶ | جمع کل | ۷۲ |
| تعداد تخم نرمال | ۱۰۵ | هنگام | ۶۵ |
| | ۱۱۳ | هرمز | ۶۰ |
| | ۱۱۳ | جمع کل | ۶۰ |
| تعداد تخم غیرنرمال | ۱۹ | هنگام | ۸ |
| | ۱۳ | هرمز | ۸ |
| | ۱۹ | جمع کل | ۸ |