

تقویم و دستورالعمل صرف داروهای ضد انگلی برعلیه کرمهای دستگاه گوارش و تنفس دامها

کپلک و کرمهای نواری (تیبا) موثر می‌باشد. در بعضی مناطق علاوه بر کرم برگی شکل (کپلک) یک نوع کرم باریک نیز دیده می‌شود که برای از بین بردن کلیه این کرمها درمان با الیندازول با دو برابر مقدار توصیه شده موجب خواهد شد که کرمهای باریک کبد هم از بین بروند.

۳- راناید (Ranoxanide)

قرص ۱۵۰ میلی‌گرمی است که روی کرم بالغ کبد (کپلک) موثر بوده ولی روی نوزاد این کرم تاثیری ندارد. به ازاء هر کیلو وزن ۷/۵ میلی‌گرم، برای ۲۰ کیلو وزن زنده گوسفند و بز یک قرص و بیش از ۲۰ کیلو وزن دو قرص استفاده می‌شود. در مناطقی که آلدگی گوسفند و بز به کرم کبد (کپلک) شایع بوده و از نظر سایر انگلها ناچیز باشد و بخواهیم به تنهایی برای درمان و کنترل بیماری کپلک از این دارو استفاده نماییم، چون نوزادها بعداً در کبد بصورت کرم بالغ جایگزین خواهد شد می‌بایستی ۳۰ روز بعد از خورانیدن این دارو برای نوبت دوم به مقادیر ذکر شده دارو تجویز شود.

۴- فازینکس (Fazinex)

قرص ۲۵۰ میلی‌گرمی برای درمان کرم کبد (کپلک) است که در مراحل مختلف سنی کرم کبد موثر بوده و به ازاء هر کیلو وزن زنده ۱۰ میلی‌گرم، برای ۲۵ کیلو وزن یک قرص و تا ۵ کیلو وزن دو قرص استفاده می‌شود. در مناطقی که آلدگی، به سایر انگلها در گوسفند و بز ناچیز بوده و کرم کبد (کپلک) شایع است و ناگزیر به استفاده از این دارو باشیم تا ۲۸ روز پس از تجویز دارو از شیر و گوشتش چنین دامهای نایابی استفاده گردد و در مواردی که بیماری بطور حاد شیوع نداشته و امکان آلدگی گوسفندان به سایر انگلها وجود داشته باشد، همانطور که در برنامه و تقویم خورانیدن داروها ذکر شده بایستی استفاده گردد.

۵- تئی رازی:

روی کرم بندبند نواری موثر بوده، آلدگی به این کرم اکثراً در فصل بهار در اواخر خرداد و تیر ماه در بردها شدت

(گوسفند و بز)

نوشته: دکتر محسن زمانی

با بررسی هایی که در دامهای عشاپری صورت گرفته است ذیلاً داروهای ضدانگلی (کرمهای دستگاه گوارش و تنفس) گوسفند و بز و زمان مصرف آنها را به دامداران توصیه می‌نماید.

۱- در اواخر خرداد و تیر ماه بردها اکثراً آلدوده به کرم نواری (تیبا) می‌باشند لذا توصیه می‌شود به ازاء ۲۰ کیلو وزن یک قرص تئی رازی و بیش از ۲۰ کیلو دو قرص به بردها خورانید یا از نیکلوزاماید به ازاء ۱۰ کیلووزن یک قرص ۸۳۰ میلی‌گرم استفاده نمود.

۲- در تیرماه آلدگی گوسفند و بز با انواع انگل‌ها ناچیز می‌باشد.

۳- در مرداد ماه گله‌هاییکه در کنار رودخانه و چمنزارها تعییف می‌شند غالباً ۱۵-۱۰ درصد آلدوده به کرم کبد (کپلک) بوده و در شهریور ماه ۴۰ درصد و در اواخر مهرماه که در محل زمستانی مستقر می‌گردند ۶۰-۵۰ درصد آلدوده بوده و برای دفع کرم کبد (کپلک) می‌توان از داروی راناید به ازاء هر کیلو وزن زنده ۷/۵ میلی‌گرم یک قرص ۱۵۰ میلی‌گرمی برای ۲۰ کیلو وزن و بیش از ۲۰ کیلو دو قرص جهت درمان کرم کبد (کپلک) استفاده نمود. چون راناید روی نوزاد کرم کبد (کپلک) موثر نیست و احتمالاً در ماههای بعد نوزاد کپلک بصورت کرم بالغ در کبد همچنین توصیه می‌شود برای جلوگیری از آلدگی مجدد به انواع کرمها در اواخر زمستان یا اول بهار، از الیندازول به مقادیری که قبل اشاره شد به گوسفند و بز بخورانند. در خاتمه برای آنکه دامداران عزیز به اثر داروها روی انواع انگلها آشنایی حاصل نمایند ذیلاً نام دارو و اثراتی را که روی انگلها دارند مذکور می‌شود:

۱- ترامیزول هیدروکلراید (نیلوم)

ولامیزول:

هردو دارو با مقادیری که ذکر شد موثر روی کرمهای نخی شکل داخل برنش و حبابچه‌های ریوی و همچنین کرمهای ریز گرد داخل شریدان و روده می‌باشد و هیچگونه تأثیری روی کرم کبد (کپلک) و کرمهای نواری بندبند (تیبا) ندارند.

۲- الیندازول:

با مقادیری که ذکر شد روی کرمهای ریه، شیردان،

برای گله‌هاییکه در مراتع بوده و امکان آلدگی به کرم کبد (کپلک) در آنها کم است، خورانیدن یک نوبت از الیندازول در اواخر پائیز یا اوائل زمستان به گوسفند و بز به مقداری که فوقاً اشاره شد کافی است.

۴- از قرص فازینکس ۲۵۰ میلی‌گرمی که اخیراً معرفی شده است و در تمام مراحل مختلف سنی کرم کبد (کپلک) موثر بوده است میتوان در اواخر مهر ماه بجای راناید بازاء هر کیلو وزن زنده ۱۰ میلی‌گرم یک قرص ۲۵۰ میلی‌گرمی برای ۲۵ کیلو وزن و تا ۵۰ کیلو وزن دو قرص و بیش از ۵۰ کیلو سه قرص به گوسفند و بز خورانید و از انجاییکه با تجویز این قرص تا ۲۸ روز شیر و گوشتش آن قابل مصرف نمی‌باشد، لذا تجویز این دارو در اواخر مهر ماه که مصادف با دوره خشکی شیر است، بدون